



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
620/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
620/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
620/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
620/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
620/A

259 (2)
FRUCTVS
MEDICINÆ
EX VARIIS GALENI
LOCIS DECERPTI.

Auctore

IO ANNE CAROLO AMATO
*Monistrolensi Doctore Medico
Montisserrati.*

Nunc primum prodit in lucem.

IN VIRTUTE



ET FORTUNA.

LVGDVNI,
Sumptibus LVDOVICI PROST
Hæredis Rouille.

M. DC. XXIII.
CVM PRIVILEGIO REGIS.



SANCTISSIMÆ

COELI DOMINÆ,
CASTISSIMÆ AC
purissimæ Angelorum ho-
minúmque Imperatrici,
Beatæ Mariæ Montisser-
rati, Hispaniarum poten-
tissimæ adiutrici.

Ioannes Carolus Amatus

D. M. & P. D. C. & O.

PRISCÆ vetustatis su-
blimioris Genij viri
(Sacratissima virgo)
de tribus sibi potissi-
mum gratulabantur. Primò quod

ex municipio vel ciuitate qua-
piã illustriori natalitia duxissent.
Secundò quod Græcos illos, non
barbaros natale solum produxif-
set. Tertiò quod viri, non mulieres
naturæ beneficio huic auræ vitali
expositi fuissent. Quæ omnia si
tanto ab omnibus emunctioris iu-
diciij viris applausu, & ambabus,
vt ita dicam, vlnis amplexaban-
tur, quanto magis nobis Christia-
nopoliticis gaudendum est quod
Christianopolitani, quod patria
Catholici, non kakolici viri, vi-
tam pro T. M. tuique filij hono-
re effundere parati, non decor-
datæ mulieres deprehendamus?
Vt verò omnium horum postre-
ma capita intacta relinquo, ita me
Christo; cor mihi gaudio exilire
videtur si me subditum Hispa-
niarum regni, quo nullum auro,
ostróque

ostróque fulgentius, nullum am-
plius, nullum sub vtroque polo
magis T. Sanctitati addictius, pro-
gnatum considerauero, animó-
que tacitus mecum perpendero,
T. Clementiæ arrisisse me sub
vmbra tuæ iurisdictionis Montif-
erratensis huic auræ exponere.
Et sanè si acutissimus Philoso-
phorum ille Aquila de plumis suæ
patriæ, Athenarum scilicet, vbi
omnis literaturæ antiquæ thesau-
rus reconditus erat, tantopere su-
perbiebat, quanto mihi iustiùs
gratulandum est, quod sub dicto
monasterio in quo omnes pieta-
tis gazæ inclusæ, ex quo omnes
deuotionis riuuli, limpidissimi,
frigidissimi, dulcissimi, in vniuer-
sam Hispaniam deriuantur, na-
tus fuerim, sub illo inquam cœ-
nobio, in quo omnes margaritæ

religionis, omnes lapides pretiosi
castitatis, omne obryzum solidæ
& probatæ obedientiæ, vel in cu-
iusvis religiosi pectoris scrinio
aceruatim latent; sub illo præfer-
tim horto, in quo arbores quoti-
dianæ, tot, tantæque magnitudi-
nis eleemosynarum excrescunt,
vt apicibus suis vel cœlum ipsum
attingere, indiesque Deo pro po-
puli peccato litare, ac suis latissi-
mis ramis vniuersas Hispaniarum
ditiones adumbrare, illasque sic
adumbratas à Sole iræ diuinæ
protegere videantur. In illo dico
territorio in quo T. M. residen-
tiam, curiamque Ecclesiæ suę par-
ticularis erigere, nihil antiquius
fuit: qua quidem in corte, vt intra
700. annos iubare tuo plusquam
diuino stupēdissimorum miracu-
lorum & oraculorum (quorum vel
memoria

memoria horrore sensus mentēq;
percutere, comasque erigere co-
gitanti solet) assiduo claruisti, ita
in hodiernum fulges æternumque
fulgebis. Sub illo denique Mona-
sterio, quod sapientissimi orbis
œconomi Hispaniarum India-
rumque Reges iuribus cudendæ
monetæ, ac omnimodæ iurisdic-
tionis, etiam mero imperio siue
gladij potestate non retenta, in-
numerisque aliis immunitatibus
ac priuilegiis condecorare di-
gnum censuerunt. Et profectò si
curiosa illa Ægyptiorum antiqui-
tas Colossos Pyramidasve sus-
metropoleos summis deliciis an-
numerabat, tacitaque compla-
centia quadam sese titillabat; quis
quæso mihi vitio verterit, si me
saltuū illorū sanctissimorum, si
me montiū T. M. pyramidalium,

quos ipsa natura, sapiens ille re-
rum architectus efformauit, qui-
busque, crede mihi, nihil elegan-
tius, nihil aspectu amabilius vel
consideratione illorum miracu-
losius adinueniri potest, accolam
natum esse deprædicauero? Om-
nibus his propius accedit, quod
T. Cl. me ad ripas illas amænissi-
mas hortorum oliuarum suarum
sanè quàm fructiferorum Moni-
strolli, huius mundi aspectu, ex-
posuerit, expositum tenellis Mu-
sarum vberibus lactarit, ab lacta-
tum substantiosiori artium triuia-
lium cibo nutrierit, nutritum Phi-
losophicis, Arithmeticæ, & Astro-
logiæ epulis iucundissimis satura-
uerit, saturatum verò ac iam ani-
mo corroboratum, in palæstras
medicarum Aca'demiarum ta-
lium, quarum professores ad instar
obryzi,

obryzi, doctores veluti iaspides,
licenciati vt aurum, reliqui rei
medicæ viri practici instar stella-
rum limpidissimarum fulgore suæ
prudentiæ, vtrumque hæmisphe-
rium illustrent, suorumque æmu-
lorum vel clarissimam lucem ob-
scurant, oppidò quàm gratiosè
produxerit, Apollinis hortula-
num constituerit, atque amplissi-
mi districtus prouinciam, curam
scilicet T. M. Capellanorum
Montisserratenſium nunc ipsos
24. annos demandauerit. Equi-
dem id factum esse à T. M. sacra-
tissima virgo subdubito, vt quo-
niam pueri Monistrolenses pri-
mum T. S. imaginem in his salti-
bus inuenerunt, saltem splendo-
rem tuæ beneuolentiæ erga meos
sympatriotas, in me conspicien-
dum exhiberes, illósque ad fer-

uentiorem erga T. S. amorem
prouocares. Postremò his omni-
bus & singulis maximis benefi-
ciis , Regina Angelorum castissi-
ma, ne T. M. quidem ipsi sategisti.
Cum enim supradicto annorum
curriculo plagiarij siue *αὐτοπαι-
στῶν* manus violentas mihi inie-
cissent, ac me captiuum abducen-
tes emungere pecunia destinaf-
sent, deficientēque pecunia vitæ
lytro debitum furtiuum extin-
ctum voluissent, quatuorque pilis
sclopetariis me petiissent, tuæ mi-
raculorum potentiae arrisit pilas
manu excutiendo, & iuxta cor-
pus brachiumque elidendo me
sartum tectumque clypeo tuæ
clementiae pristinae & vitæ &
spartæ restituere. Huius & con-
cessæ & conseruatae vitæ, præno-
minatorumque & aliorum im-
morta

mortalium T.M. erga me benefi-
ciorum memoriam si obliuioni
traderem, stigma ingrati animi iu-
re optimo mihi inuri posset, nec
fane si vellem, possem. Indies
enim tuorum beneficiorum ocu-
lis meis obuersatur imago, tacité-
que mihi hæsitanti insusurrat, vt
parrhisia T. beneuolentiæ fretus
quadantenus animi grati vmbram
demonstrarem, ac mecum illud
reputarem,


*Vt desint vires, tamen est laudan-
da voluntas.*

Qua de causa, cum tempore
meorum studiorum ac quantum
per otium mihi licuit suprame-
moratorum 24. annorum, vastif-
simos medicinæ campos peruoli-
tando, ac digitis ingenij ac iudicij
mei succum florum agglutinādo,
inque vnum aluear conferendo,

exinde mellitos hosce fructus me-
dicinales confecissem, ac publici
iuris illos facere constituiissem,
ipse locus meæ natiuitatis horten-
sis mihi consulendo à tergo in-
sufurrauit, tacitum quoddam ius
vassallagij T. M. in hos fructus
competere, méque citra consen-
sum Domine illos dedicando
alienare non posse. Ne itaque ego
T. M. vassallus feloniam aliam
incurram humili ac submisso ani-
mo illos tibi exhibeo, méque ad
exequendum in posterum ea fi-
deliter quæ in iurisdictione man-
dantis extrema erunt, pro posse
offero. T. M. ô Potentissima virgo,
ex intimis mei cordis visceribus
humillimè & deuotissimè obte-
stans, vt clementissimè illos à me
tuo fideli suscipere, domúmque
hanc Montisserratensem stabili-
tam,

tam, fulcitamque tua potentia im-
menſa conſeruare, ab omni malo
præſeruare, verè religioſos illos
tuos milites vexillo tuæ pietatis
protegere, per illos feudalem
tuam Eccleſiæ iuriſdictionem
propagare, méque T. M. Valuaſi-
num minimum agnoſcere non
graueris. Dat. Mont. Anno 1622.

A D




Ad Lectorem, S.

Fruetus nostros hosce Medicos,
candide Lector, ex illustrissimo
non minus quàm totius orbis terrarum
fertilissimo illo Musarum omnigena-
rum Apollinisque insignis Aragonie
coronae Valentinae ciuitatis pomario, so-
lum Galeni doctrinae dicato, ingenio
nostri digitis decerpimus, illosque ti-
bi, tuisque commodis, atque vniuer-
sae rei medicae proficuis vsibus offeren-
dos iudicauimus. Non quidem, ut il-
lorum suauitatibus bellaria Syrenum,
vel verborum illecebras tibi propone-
remus (hoc enim illorum est, qui ni-
mia dulcedine verborum ac senten-
tiarum scripta sua medica coardare,
vel nescio quo elegantiae putatiuae
philtro, grauissima quandoque inge-
nia

nia inebriare , nihil sibi piaculi du-
cunt) sed potius ut cera Vlyssæa aures
tuas his cantibus obturantes, reſeratis
illis lynceis oculis portum tandem ve-
ritatis tibi conſpiciendum laborare-
mus ; collectaneaq; hæc talia tuis ocu-
lis exhiberemus , ut externa ſymme-
tria internam bonitatem commenda-
re, tuq; exinde ſenſus tuos & externos
& internos oblectare poſſes. Hoc verò
ut eſſem conſequutus , ſcire te velim
me ex prædictæ Academia fertilissi-
mis, iucundiſſimisq; ac totam medi-
corum utriuſque peripheriæ regionem
mirificè decorantibus campis non ſine
oblectatione ac Phæbea quadam cupi-
ditate indiſtriæ , tum theorias , tum
praxeos indefeſſis alis hos fructus ſe-
lectos collegiſſe , in unum alvear con-
tuliffe, ac liquore ſubtilitatis, ingeni-
que dexteritatis præclariſſimorum vi-
rorum de re medica diuinitus merito-
rum

rum D.D. Ioannis Plaçæ, Iosephi Re-
guardi, Iacobi Sagarre, & Vincentij
Salat irrorasse, atque omnia illa ad
suam mellitam suauitatem redacta
fauis loco tibi nunc exhibere. Tui officij
erit gustu percepto aduersus Zoili a-
maros dentes hunc fauum à corruptio-
ne præseruare, meq; campos latissimos
medicinæ peruolantem ac suauiora col-
ligentem, cultura tui quoque genij &
ingenij hortuli adiuuare, atque hæc
medicè, æqui bonique consulere. Vale.

E I Σ



ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΡΟΛΟΥ

Αμάτς ἱατρικῆς

καρπῆς

Επίγραμμα.

Μὴ βραχὺς ἐκδοκ' ἐσθ' βίῃ, μή ποτε
μακρὴ

καὶ τρηχὺς τέχνη τοῖς ἱατροῖς ἐσέ-
ται.

Ρηίδιον γδ' ἔχουσιν ὁδὸν, μάλα δ' ἔγχε
ναίει


Οὐλομήνων κρίσις, πᾶσαι τε πῆρα
νόται.

Κάρολ' ὠραῖα περφέρει καλὰ δώ-
ρεα καρπῆς,

Εἴνθ' ὑμῶς δώσῃ καμρὸς ἀλεξικα-
κῆς.

Νόνν' Ἀντώνι' Δεσκαυλ' ἐσί'
κοινεβίτης καὶ σχολάρχ' ἔ
πρὸς κροεῖδ' ὁ μονασθεῖν.

DE



DE IOANNIS CAROLI
AMATI DOCTORIS
MEDICI FRUCTVOSIS
præceptionibus

EPIGRAMMA.

EST sanè Hippocratis quod ame-
tur in arte, salubrem
Sanandi paucis edocuisse viam.
Nec verò ipse potest inamabilis esse
Galenus,
Dum tantas medicæ congerit artis
opes.
Attamen illius breuitas obscura vi-
detur:
Huius connectunt proflua verba
moras,
Hic facile & breuiter disces: & gratus
amabis
Auctorem. Quidni? Nominis omen
habet.

Æ. Antonius Descaulesius Monachus
Benedictinus Montisferrati.

*Summa Privilegij à Christianissimo
Galliarum Rege concessi.*

LUDOVICI XIII. Galliae, &
Nauarrae Regis auctoritate sanc-
tum est, atque patentibus literis cau-
tum, ne quis in Regno suo, aliisve locis
ditioni suae subiectis, intra proximos
annos decem, à die impressionis primae
inchoandos, ac numerandos excudat,
excudendum, vendendumq; quouis mo-
do, & ratione curet librum, qui inscribi-
tur, *Fruetus Medicinae, Auctore IO ANNE
CAROLO AMATO, Monistrolensi, Do-
ctore Medico Montisferrati*, præter LVDO-
VICVM PROST Hæredem Rouille, Bi-
bliopolam Lugdunensem, aut illos, qui-
bus ipse concesserit. Prohibitum insu-
per eadem auctoritate Regia omnibus
suis subditis, eundem librum extra re-
gni sui limites imprimendum curare,
vel quempiam, ubicumque fuerit, ad id
agendum impellere, ac instigare, sine

CON

consensu dicti LUDOVICI PROST; Idque
omne sub confiscatione librorum, aliis-
que pœnis originali diplomate contra
delinquentes expressis. Datum Lugduni
die 16. Decemb. 1622.

De mandato Regis

Signatum,

PERROCHEL.

ELENCHVS EORVM
*quæ in hoc opusculo
continentur.*

- I. De Indicationibus & scopis
remediorum.
- II. De essentiis, caussis, & signis
morborum.
- III. De materia medica, & san-
guinis missione.
- IV. De facultatibus medicamen-
torum compositorum, &
dosibus.

DISPV



DISPUTATIO

De

INDICATIONIBVS.



ALENVS *lib. de sectis.*
 & *lib. ad Transf.* docet,
 antiquorum Medicorum
 tres fuisse sectas, Em-
 piricam, scilicet, Methodi-
 cam, & Rationalem: quæ tres sectæ
 affinitatem & communitatem inter sese
 habent: Conueniunt sanè tribus modis.
 Primo, quia omnes earum sectatores
 artem medicam professi sunt; Secundo
 quia omnes eandem rem pro scopo ha-
 buerunt, scilicet, sanitatem. Tertio, quia
 omnes artem medicam collectionem
 præceptorum appellarunt. Cæterum,
 quamuis his tribus nominibus commu-
 nicant inter sese, maximè distant; nam
 Empirica artem medicam experienciâ &

A

odier

obseruatione sibi comparauit, Methodica ex rei naturâ & communitate inuenit, & Rationalis viâ, & methodo rationali inuestigauit, omnibus particularibus communia.

Ex his autem sectis Empirica & Methodica sunt contemnendæ; Rationalis verò complectenda, quæ arte & methodo docet omnibus particularibus communia. Methodicè verò rem aliquâ tractare ex aduerso, apponitur ei, quia est temerè & fortuna ita inuenire, est enim methodo aliquid tractare cum viâ quadam & ordine rem tradere; ita vt in disquisitione aliud sit primum, aliud secundum, aliud tertium, & aliud quartum, &c. quo vsque ad ipsum, quod est ab initio propositum peruentum sit, vt Galen. 1. *meth. cap. 4.* docet. Hæc enim rationalis methodus medendi per Indicationes fit; quicquid enim ab experientia separatum & seiunctum est, id totum Indicatio vocatur: quando quisquam voluerit ad vnguem methodum medendi rationalem conficere, à primis Indicationibus incipiat, deinde ad alias
ordine

ordine perueniat, neque defistat; donec finis sit compos, vt Gal. 2. meth. cap. 7. demonstrat.

Quare vt methodus hæc medendi rationalis intelligatur, perfecta debet esse Indicatio, & proinde breuem quandam dispositionem Indicationum trademus: quam tractationem ab illius diffinitione incipiemus, vt intelligatur id, de quo est nobis disputandum.

DE INDICATIONIS diffinitione.

INDICATIO est rei agenda insinuatione, vt Galen. 2. meth. cap. 7. & 3. meth. cap. 1. docet; nam ipsa indicatio veluti indice nobis demonstrat, quid agendum sit; quæ diffinitio tantum est nominis seu notionis, vt 2. meth. cap. 7. docet Galenus: diffinitio verò rei traditur à Gal. lib. ad Trans. cap. 11. dicens: Indicatio est comprehensio rei iuuantis, simul cum comprehensione nocentis citra experientiam & obseruationem; Indicatio enim facit, vt comprehensa re iuuante in morbis curandis illicò com-
A 2 prehen

prehendamus rem nocentem; vt si morbus sit calidus, indicatione comprehendimus frigidis curari, calidis verò noceri; id verò comprehendimus non experientia & obseruatione, neque ratiocinio aliquo, sed ex rei natura.

Altomarius 8. *lib. de feb. med. par. i. cap. 23.* explicans diffinitionem Indicationis à Gal. traditam *lib. ad Transf.* ait, per rem iuuantem debere nos intelligere materiam iuuantem, quâ curantur morbi; per nocentem verò, non materiam nocentem, quam lædunt ægri; sed affectum præter naturam; qua in re deceptus fuit; nam Indicatio, vt diximus ex Gal. 2. *meth. cap. 7.* & 2. *meth. cap. i.* est insinuatio rei agenda; affectus verò præter naturam non est res agenda in curatione morborum: ergo per nocentem non debemus nos intelligere affectum præter naturam, sed materiam ægrum lædentem. Præterea si Indicatio est comprehensio rei iuuantis, & materiæ quoque, necessario ergo per nocentem, materiam debemus intelligere nocentem, & non affectum præter naturam: nam contrariorum

rum eadem est ratio & disciplina.

DE DIVISIONE Indicationis.

INDICATIO in vniuersum duplex est, alia curatrix, alia non curatrix, quam diuisionem tradit 9. meth. cap. 13. Indicatio non curatrix est, ex quâ non deliberamus de remedio, neque de illius scopo, quæ à viribus tantum sumitur, quæ per se tantum indicant sui conseruationem & custodiam, quamuis ex accidenti faciant ad curationem; multoties enim cogimur in administratione alicuius remedij viribus prostratis eas corroborare, vt Galenus loco citato demonstrat.

Vires autem nostrum corpus gubernantes in triplici sunt differentia: alia enim sunt animales, alia vitales, & alia naturales, vt Gal. 7. de Placitis, & 9. meth. c. 10. docet; ait enim has vires seruare nihil aliud esse quam vitam custodire, vt Gal. loco citato docet, & proinde docet maximam esse dignitatem virium. Ani-

A 3 malis

malis enim vis & facultas sedem habet in cerebro, quæ sensu & motu voluntario cognoscitur; vitalis verò in corde quæ pulsu dignoscitur; naturalis verò quamvis in omnibus partibus reperitur, potissimum tamen in hepate posita est, quæ ex concoctionibus dignoscitur.

Ex his tamen viribus vitalis dignior & præstantior est, animalis verò maximi est momenti in ægrotis, propter respirationem, quæ à facultate animali dependet, ut Gal. 7. *meth. cap. ult.* docet. Naturalis verò non est tanti momenti, quamvis debeat esse robusta in venis, ut humorem noxium in illis existentem concoquere possit, illumque superare.

Vires autem in triplici substantia nostri corporis collocantur; solida, carnosa, & spiritosa; labuntur autem vires, ait Gal. 9. *meth. cap. 13.* duobus modis: vel dissipatâ substantiâ earum partium, in qua positæ sunt, aut alteratione; alteratio verò partium vel contingit à totâ substantiâ, vel à qualitate aliquâ manifestâ: si enim vires labantur, dissipata substantia alimento restauranda est, si-
quidem

quidem substantia solida cibo restauratur ; humida potu, spiritosa inspiratione & tractu arteriarum , vt i. *sanit. tuend. cap. i.* Gal. docet.

Quare decipiuntur multi Medici, qui in quouis virium lapsu præscribunt cardiaca medicamenta , vulgò cordialia. Si enim vires labantur alteratione à tota substantia, vt tempore pestis & venenis sumptis, à tota substantia nostræ naturæ contrariis, conuenit alexipharmaca medicamenta à totâ substantiâ agentia exhibere & propinare, & non erit necessarius vsus cardiacorum siue cordialium : si autem vires labantur à manifesta qualitate, vt à calidis, frigidis, &c. à contraria qualitate sunt corrigendæ, & hæc de Indicatione non curatrice.

Indicatio verò curatrix ea est, ex qua deliberamus de remedio , vel de aliquo illius scopo ; hæc autem triplex est. Prima sumitur à morbo. Secunda à naturâ. Tertia verò ab ambiente ; quam diuisionem tradit Gal. *9. meth. c. 14.*

Verùm dices , Indicationem curatricem nō esse triplicem, sed duplicem tan-

tum, quia Indicatio, quæ ab ambiente desumitur, potest reuocari ad Indicationem petitam à causâ, quoniam aër ambiens si est contrarius morbo inter causas iuuantes connumeratur, si verò morbum iuuat, illique similis est, inter causas ægrotantes & nocentes connumerandus erit: Ergo Indicatio, quæ sumitur ab aëre ambiente, referri debet ad Indicationem petitâ à causâ, ergo tantû duplex est Indicatio curatrix & non triplex.

Respondemus, verum esse, Indicationem ab ambiente desumptam, reduci posse ad Indicationem desumptam à causâ, verum clarioris doctrinæ gratiâ, hanc Indicationem ab ambiente desumptâ ab illa separauit, & ita docet tres esse differentias Indicationis curatricis.

Prima ergo Indicatio curatrix à morbo sumitur, quæ quidem in tot diuiditur differentias, quot sunt morborum species. Ad hanc Indicationem à morbo petitam reuocatur Indicatio desumpta à vi & magnitudine morbi, nam vis & magnitudo morbi indicantur ex Hip. 1. Aph. sect. 6. vbi docet extremis morbis
extre

extrema remedia esse adhibenda, illa namque extremitas & magnitudo morbi indicant, extrema remedia esse à Medico præscribenda, eâ ratione quâ demonstra-
uit Gal. ex Hipp. 4. *meth. cap. 6.* Ad hanc etiam Indicationem à morbo desumptam reuocatur Indicatio, petita à causa, quæ quidem duplex est, interna & externa; interna in humoribus, spiritibus & partibus solidis posita est: quæ cum perpetuò præsens sit, perpetuò indicat sui ablationem, quæ multis modis auferri solet, sanguinis sc. missione, purgatione per quamvis partem factam, clysteribus, cucurbitulis, frictionibus, exercitatione, & balneo: externa verò causa multiplex esse solet, quæ si præsens sit, indicat sui remotionem, ut si sagitta sit infixæ, indicat sui separationem.

Verum obiicies: Gal. lib. ad Trans. docuit ab euentibus non sumi Indicationem, sed causæ externæ sunt euidenter. ergo, &c. & Gal. eod. lib. dixit, Indicationes à causis euidentes non esse; imò causæ ut causæ sensus abditæ sunt & occultæ, ergo causæ externæ præ-

A s

sentes

sentes quatenus causæ sunt, euidentes non sunt, ab illisque sumitur Indicatio; ut causæ externæ tales sint, ut ensis, gladius, &c. tuncque ab illis non sumitur Indicatio. Respondeo, si causæ externa non sit præsens, nihil indicat; ut si aliquis sit percussus lapide, lapis nihil indicat: quia cum præsens non sit, nihil indicat, verum quamuis causæ externa non præsens, non indicat, nihilominus tamen conducit ad cognoscendum affectum factum. Hæc verò Indicatio, quæ sumitur à causæ tam externa quàm interna, curatrix non est, sed præseruatricem; ad curationem verò refert: quia eisdem præseruamus remediis, quibus curamus: ad hanc autem Indicationem à morbo desumptam reuocatur Indicatio, quæ sumitur à symptomate. Sed dicet aliquis, à symptomate non sumi Indicationem curatricem, quia simul cum morbo auferuntur symptomata. Respondeo, symptomata quatenus symptomata sunt, nihil indicare, nam sublati morbis, quos sequuntur, auferuntur. Si verò symptomata habeant rationem causæ,

causſæ, augeantque affectum, vel labefa-
ctent vires, tunc ab illis Indicatio cura-
trix ſumitur, indicantque eo tempore
ſui remotionem, vt Gal. 12. *meth. cap. 1.*
docet, quod exemplis manifeſtum fiet,
habeat aliquis in aliqua parte corporis
vehementem dolorem, ille dolor, quam-
uis ſymptoma ſit, ſedandus eſt, quia tum
auget affectum, tum etiam quia labefa-
ctat vires, quas diſſipat immodicâ eua-
cuatione, quæ ſymptoma eſt in excretis,
verum quoniam labefactat vires, corri-
genda eſt; immodica etiam vigilia, etiâ ſi
ſymptoma ſit, corrigenda eſt, ſomnus
quoque vires proſternit, quod Gal. 12.
meth. docet, quamobrem hæc ſympto-
mata, quæ augent affectum, & labefa-
ctant vires, ſunt admodum corrigenda.

Secunda Indicatio curatrix ſumitur
à natura, quæ quidem duplex eſt, alia
communis, alia propria; Communis eſt
quâ conueniunt omnes homines inter
ſe, ſcil. naturâ, quæ maximam habet la-
titudinem; nam poſſumus intelligere
nomine naturæ communis, communem
illam naturam, in qua conueniunt om-

nes

nes homines eiusdem temperamenti, ut natura biliosorum, pituitosorum, &c. Propria natura est proprium cuiusque temperamentū, hæc sanè propria natura maximè cognoscenda est à Medico, ut Gal. 1. *ad Glau. c. 1.* docet, quoniā ex propriā naturā metimur lapsum, & ex lapso quantitatem remedij; & ideo idem Gal. 3. *meth. cap. 7.* demonstrat illum esse optimum Medicum in curandis morbis, qui methodum sibi comparauit cognoscendi propriam naturam. Hæc verò propria natura vel est totius vel partis, utramque verò debet Medicus cognoscere, ut Gal. 3. *meth. cap. 7. & 9.* docet: Hæc verò propria natura non potest intra rationem cognosci, sed artificiosâ coniecturâ, ut Gal. 2. *meth. cap. 7.* docet: Ut verò hæc propria natura siue totius siue partis cognoscatur, fecit Gal. duos libros de Temperamentis, & arte medica; quibus signis Medicus artificiosâ coniecturâ potest cognoscere propriam naturam totius, quam à Medico cognoscendam esse diximus, quemadmodum & naturam partis.

Verum

Verum obiicies, à natura non sumi Indicationem curatricem, quia natura indicat sui conseruationem quemadmodum vires: ergo quemadmodum à viribus non sumitur Indicatio curatrix, ita neque à natura.

Respondemus, quòd quamuis natura indicat sui custodiam ad conseruationem, nihilominus tamen ab ea sumitur Indicatio curatrix, quoniam ex illa deliberamus de quantitate remedij, & ita à natura propria sumitur Indicatio curatrix, & non à viribus, quoniam ab istis per se non deliberamus de remedio, neque de illius quantitate quemadmodum à natura: nam à propria natura metimur lapsum & ex lapso quantitatem remedij, vires verò indicant tantum sui conseruationem & custodiam, vt dictum est.

Ad hanc Indicationem, quæ sumitur à natura, refertur Indicatio, quæ sumitur à consuetudine, quia consuetudo est quædam natura acquisita, (quamuis Vallesius vult à consuetudine non sumi Indicationem curatricem.) & Indicatio quæ

quæ sumitur ab ætate, & à sexu.

Tertia Indicatio curatrix sumitur ab ambiente : ab illo namque sumitur in arte medica Indicatio curatrix, nam velimus, nolimus, aërem attrahimus, cum illo quo necessariò versamur.

Cæterùm, argumentum nititur demonstrare aduersus Galenum, aërem ambientem non indicare.

Natura remediorum non indicat, sed indicatur.

Sed aër ambiens est natura remedij.

Ergo aër ambiens non indicat, sed indicatur.

Respondeo, distinguendo maiorem dicens, materiam remediorum duplicem esse: aliam communem, aliam propriam, materia propria indicatur, & non indicat, communis verò materia remediorum, qualis est aër ambiens, indicat necessariò, nam vt superiùs diximus, velimus, nolimus, aërem attrahimus, & continuò cum eo versamur, corpùsque nostrum semper alterat, & commutat, & proinde communis materia est dicendus, & ideo ab illo sumitur Indicatio
cura

curatrix. Ad hanc Indicationem desumptam ab aëre ambiente refertur Indicatio, quæ sumitur à regione, à cœli statu, ab anni tempore, à quibus sumitur Indicatio curatrix, quia ex his deliberamus de quantitate remedij; reuocaturque hæc Indicatio, quæ ab aliis sumitur ad Indicationem, quæ sumitur ab ambiente.

Præterea Indicatio curatrix diuiditur in primam seu præcipuam, & coindicationem; prima à morbo sumitur, vt Gal. 3. *meth. cap. 1.* docet; quæ sanè Indicatio à morbo petita tantum est prima, & vt ita dicam, carcer methodi medendi, quæ quidē methodus ex aliis Indicationibus perficitur; hæc enim Indicatio à morbo desumpta nota est plebeis hominibus, nam plebei norunt calidum morbum frigidis remediis esse curandum, & contrà.

Coindicatio est, quæ simul cum Indicatione indicat, vt est Indicatio, quæ sumitur à viribus, à natura, à consuetudine, ab ætate, à regione, à cœli statu, & à sexu, & ab aliis si quæ sunt huius generis,

neris, vt Gal. 13. *meth. cap.* 18. docet, quare Indicatio ex Galen. loco citato comprehendit curatrices, & non curatrices Indicationes, comprehendit etiam Indicationem, quæ sumitur à viribus, quæ Indicatio curatrix non est.

Rursus Indicatio curatrix diuiditur in propriam & communem; Propria Indicatio est, quæ sumitur à re aliqua propria, vt est Indicatio, quæ sumitur à propria natura, & quæ sumitur à morbo peculiari, & à regione, & à proprio anni tempore, & ab aliis huiusmodi. Hæ enim Indicationes propriæ sunt, quoniam non curat Medicus hominem in vniuersum, sed solum Ioannem, Petrum, Franciscum, &c. qui habent propriam & peculiarem naturam, vt Galen. 3. *meth. cap.* 7. & aliis in locis docet, neque omnes morbi habent eandem naturam, neque in eadem regione, neque eodẽ anni tempore eueniunt, proinde ab his omnib. sumitur peculiaris Indicatio.

Communis verò Indicatio est, quæ sumitur ab aliqua re communi, vt est Indicatio, quæ à morbis sumitur in vniuersum :

uerſum : nam omnes morbi habent cō-
munem Indicationem, ſcil. ſui ablatio-
nem, & omnes febres quatenus febres
communem etiam habēt Indicationem,
ſcil. refrigerationem, & quò communior
erit res, eò cōmunior ab ea petetur Indi-
catio, & proinde Indicatō, quæ ſumitur
à morbo, communior erit ea quæ ſumi-
tur à febris, quoniam morbi vis magis eſt
communis quàm febris, qua autem ra-
tione id, quod commune eſt, expendere
conueniat, ex illa intelligemus quæ Gal.
1. meth. cap. 7. docet.

Cæterum particularis Indicatō ma-
gis exceſſum demonſtrat quàm natura-
lis : nam Medicus, vt diximus, non cu-
rat hominem in vniuerſum, ſed in par-
ticulari, hæ verò particulares vtilius ex-
ercentur quàm communes, quoniam
propria remedia oſtendunt : quod Gal.
13. meth. cap. 12. oſtendit, docens diſtin-
ctionem inter proprias & communes
Indicationes, aitque eo loco : Indicatō-
nes communes non minùs vtilis ſunt
quàm noxæ, quod exemplo phlegmonis
natæ in iecore demonſtrat Galen. quam
rem

rem eleganter & copiosè multis exemplis ex variis Gal. locis Colladus in sua *Isagoge* cap. 10. demonstrat.

Quarta diuifio est, qua diuiditur Indicatio in simplicem & compositam, qua diuisione non solum diuiditur Indicatio curatrix sed Indicatio in vniuersum, nam Indicatio, quæ sumitur à viribus (quam non curatricem statuimus,) sub hac diuisione complectitur: ergo Indicatio in vniuersum vel est simplex vel composita: simplex est quæ ab vna re tantum simplici sumitur, vt ea quæ sumitur ab intemperie calida, nam quod vnum est vnum indicat, vnâque tantum habet Indicationem; nisi illud vnū diuersam habeat naturam, nam tunc quamuis vnum sit, non habet vnâ & simplicem Indicationem, sed compositam, quod exemplo bilis redundantis demonstrat Gal. *lib. ad Trans. cap. 4.* nam illa quatenus acris est & mordax, indicat retusionem mordacitatis & acrimoniæ; quatenus verò multa, indicat euacuationem; quatenus verò calida, refrigerationem: ergo vna & eadem res, habens

bens diuersam naturam compositam habebit Indicationem, quæ à duobus affectibus simul existentibus vel à pluribus sumitur, vt est Indicatio quæ sumitur à morbo calido & sicco, &c. quam diuisionem tradebat Gal.4.*meth.cap.11.*

Tandē compositæ Indicationes subdividuntur: nam vel sunt concordēs, vel contrariæ: concordēs sunt, quæ in vnum consentiunt, vt si Ioannes naturā frigidus sit, ætate frigidā, ambiente frigido, assuetus alimentis frigidis, &c. febre corripiatur: tunc multæ sunt Indicationes: verū illæ omnes concordēs sunt, quia in vnum conspirant: omnes namque suadent & indicant remediis frigidis esse vtendum.

Contrariæ Indicationes sunt, quæ contraria indicant, ita vt quod vnum iuuat, alteri noceat, vt docet Gal.8.*meth. c.9.* itaque contrarię Indicationes non dicuntur, eò quòd ab oppositis sumantur, nam aliquando sumuntur à contrariis, & illæ non sunt contrariæ, vt statim dicemus, sed reuera dicuntur contrariæ Indicationes, quòd indicata sunt contraria,

traria, qua in re fuit deceptus Argente-
 rius existimans vires & naturam, quia
 contraria sunt morbis, contrarias cum
 morbo habere Indicationes. Verum
 quomodo fuit deceptus ex Gal. 8. *meth.*
cap. 9. intelligemus, ubi docet, si natura
 frigido morbo afficiatur, tunc concor-
 des esse morbo & naturae Indicationes,
 quamvis morbus & natura sint oppo-
 sita, quod etiam in Marasmo ostendere
 possumus, nam eo, quod indicat virtus
 & morbus, non sunt contraria, cum sim-
 pliciter virtus & morbus sint opposita:
 ergo aliquando Indicationes sumuntur
 à contrariis, & ipsae inter sese non sunt
 contrariae: praeterea aliquando, à qui-
 bus sumuntur Indicationes, contrariae
 non sunt, & ipsae Indicationes sunt op-
 positae, v.g. si phlegmon coniunctus sit
 cum ulcere, sanè phlegmon & ulcerus
 contraria non sunt, & tamen contrarias
 habent Indicationes, quoniam quod
 prodest phlegmoni, aduersatur ulceri,
 haec verò contrariae Indicationes vel fiunt,
 quia affectus sunt contrarii, qui contra-
 ria indicant, vel quia tantum vnicus
 affectus

affectus reperitur, qui contrariam Indicationem habeat naturæ, ætati, regioni, cœli statui, vel alicui alteri, in quo Indicationem non sumimus, vt Galen. docet 3. meth. cap. ultimo.

In his autem contrariis Indicationibus exercendis duo debet Medicus expendere; Indicationum numerum, earumque dignitatem, & magnitudinem, vt Gal. loco citato docet, quam rem exemplis demonstrare oportet: Fingamus Socratem naturâ calidum & siccum, in ætate calidâ & siccâ, ambiente calido & sicco, in regione calidâ & siccâ assuetum alimentis calidis & siccis, febre affici, in eo sanè multæ & discordes sunt Indicationes: nam Indicatio quæ sumitur à febre docet frigida remedia esse adhibenda, reliquæ verò Indicationes indicant calidis & siccis esse vtendum. In his sanè Indicationibus maior numerus est Indicationum, quæ habent calida & sicca remedia esse adhibenda, sola enim Indicatio, quæ à febre sumitur, docet remediis frigidis esse vtendum.

Cæterùm licèt vna sit Indicatio, quæ
sumitur

sumitur à febre, nihilominus tamen magnitudine & dignitate reliquas omnes Indicationes superat, præsertim si à natura plurimum recesserit febris illa: nam tunc duplex erit magnitudo Indicationum à febre petita. Prima est quæ à febre desumitur. Secunda est, quæ à natura plurimum recessit, si autem febris sit parua, ita ut sit exiguus lapsus, tunc licet aliquas Indicationes cum ea conferre, etsi videatur magis refrigerare quàm calefacere, nec humectare magis quàm exsiccare, sed media victus ratio est præscribenda, aliisque remediis est utendum: si autem aliqua Indicatio superest, tunc à medio victu & à mediis aliis remediis recedere oportet, cum tamen illa superet sua contrarietate, & proinde in his Indicationibus exercendis Medicum esse exercitatum oportet, & naturâ prudentem, quam rem fusissimè Gal.explicat 8.*meth.cap.vlt.*

Rursus alio exemplo possumus hanc rem demonstrare, sit aliquis qui habeat affectum euacuationem postulantem, & vires habeat languidas, in eo sunt contrariæ

trariæ Indicationes, tamen dignior est Indicatio quæ sumitur à viribus, quàm Indicatio quæ sumitur ab affectu: nam, vt superius diximus, est maxima dignitas virium; nam vires seruare nihil aliud est quàm vitam custodire. Verùm cum Indicationes exercere maximè momenti sit, proinde vlteriùs rem hanc ex Galen. 7. meth. cap. 12. explicare oportet, docet enim in contrariis Indicationibus aliqua esse à Medico considerata. Primum, quis affectus ex aliis magis vrgeat: nam vrgentiori affectui magis est succurrendum alio non neglecto. Secundum docet esse considerandum, quis affectus ex illis habeat rationem causæ alterius affectus, & affectui habenti rationem causæ est priùs succurrendum. Tertium, est considerandus ordo, sc. quid ante quid, quid cum quo, & quid post quod, sit curandum. Primum namque quod considerandum esse diximus, est quis affectus magis vrgeat, vrgentia verò affectus ex illius magnitudine expendi debet: est enim affectus magnus, ex quo pendet vitæ periculum: qui quidem est
triplex

triplex teste Gal. 4. *meth. cap. 6.* Primo modo dicitur magnus morbus in sua essentia, ut magnum vlcus in crure vel alia parte principe, ut morbus existens in corde, cerebro, hepate & ventriculo, qui ad hepatis portionem se habet, ut docet Gal. 7. *meth. cap. ult.* Secundo dicitur morbus magnus, ut apertura quæ est in parte principe, & morbus existens in corde. Cæterum est aduertendum, omnes morbos in his partibus principibus existentes esse magnos, nam si ex illis non immineat vitæ periculum, magnus non erit, vnde febris diaria morbus magnus cordis non est dicendus, quoniam ex illa non imminet vitæ periculum. Tertio appellatur morbus magnus, eò quod sit cacoëthes vel mali humoris, ut vlcera iuxta articulos existentia, quæ quamuis praua non sint, magnus morbus esse censetur propter cacoëthem & malum humorem: febris etiam pestilens, quamuis non habeat magnum aut multum ardorem, magnus morbus erit, carbunculus etiam quamuis sit exiguus tumor, magnus morbus est dicendus propter

propter cacoëxiam & malignitatem quam habet.

Vrgentia ergo in morbis ex hac triplici magnitudine affectus est expendenda, vrgentiori alio neglecto, vt si fingamus Ioannem habere ardentissimam febrem, ex cuius ardore & acrimonia caloris timemus ne incidat in febrem hecticam marasmodem, huic ardentissimæ feбри neglecta indicatione quæ sumitur ab aliis affectibus in ea existētibus, priori est succurrēdum. Quam rem docet Gal. 8. *meth. cap. 10.* illi enim succurrendum est propter vrgentiam, quæ ex magnitudine & essentia febris desumitur.

Præterea rem hanc alio exemplo confirmare oportet. Sit scēmina aliqua cui sint suppressa mēstrua, & anginā patiatur, ex illa menstruorū suppressione natam, in illa enim cōtrariæ sunt indicationes à contrariis affectibus ortæ, alia sumitur à mensibus suppressis, quæ indicat menses esse sistendos, & alia quæ docet anginam esse curandam, ex his sanè indicationibus contrariis prius

B

est succurrendum angine, quia ex ea magis imminet vitæ periculum, quam suppressioni mensium, quamvis angina nascatur ex illa mensium suppressione; & ita censeo propter anginam mittendum esse sanguinem ex brachio, & non ex pede, licet menstrua sint suppressa, quia prius urgentiori est succurrendum quam causæ affectus; si autem ille non esset affectus vrgens, affectui rationem causæ habenti prius succurrendum erit, vt infra dicemus.

Multis aliis exemplis rem hanc demonstrare possemus, verum breuitatis causâ his contenti erimus; si autem in contrariis indicationibus non sit affectus qui vrgeat, considerandus est quis habeat rationem causæ alterius, & affectui habenti rationem causæ succurrendum est prius, vt si fingamus hominem aliquem febrem putridam pati, quæ nimis ardens non sit, in ea sanè prius considerandæ sunt multæ indicationes contrariæ, scilicet indicatio quæ sumitur à febre putridâ, prohibitâ transpiratione, obstructione, & causis obstructionis,

tionis, ex his namque affectibus nullus magis vrget quàm alius : nam ex aliquo illorum non imminet magis vitæ periculū quàm ex alio; proinde, à caussis obstructionis curatio erit inchoanda, deinde deuenire oportet ad obstructionē quæ causa est prohibitæ transpirationis, & ad prohibitam transpirationem quæ causa est putredinis, rursus ad putredinem quæ causa est febris putridæ, tandem ad febrem curandam accedendum est, quam rem docet Gal. 11. meth. cap. 10. vide ergo quā ratione affectui habenti rationem causæ, si vrgentia non sit, succurrendum sit.

Alio etiam exemplo hanc doctrinam summopere necessariam confirmare possumus. Sit aliqua fœmina in qua sint suppressa menstrua, ex quā suppressione nata sit inflammatio aliqua non magna in facie, vel in mammis, vel in aliā quavis parte, ab illa inflammatione non magna non sumitur indicatio, cūm ex illis duobus affectibus nullus magis vrgeat quàm alius, proinde, affectui habenti rationem causæ est prius succurrendum;

& ideo suppressioni mensium quę causa fuit inflammationis, prius est succurrendum.

Si autem non sit affectus vrgens ex quo magis immineat vitę periculum, nec affectus habens rationem causę alterius reperiatur, ordinem considerare oportet, quid scilicet ante quod, id est, quem affectum ante alium curare liceat, quid post quod, id est, quem affectum post alium, & quid cum quo, id est, quem affectum simul cum alio; quod exemplo vlcis iam sordidi cum phlegmone coniuncti demonstrari poterit, nam tunc sunt contrarij affectus, ex quibus vnus magis quā alius non vrget, nec vnus habet rationem causę alterius, proinde in illis affectibus curandis ordinem prædictum debemus considerare, ideoque prius erit curandus phlegmon, nam si ille prius nõ curetur, alij affectus curari non poterunt, quia ex illo perpetuò aliquid resudabit & sordidum remanebit vlcus. Rursus curato phlegmone sordes sunt extergendę, quę si non abstergantur caro non poterit

poterit regenerari, & ita simul vlcus curatur & carne impletur. Tandem post hæc, circatrix induranda erit. Hæc ergo tria explicata medicus consideret in intelligendis & exercendis indicationibus, de quibus debet esse sollicitus; nam etsi sint contrariæ indicationes, poterit facillè artem medicam exercere.

Ex his indicationis diuisionibus intelligemus nomina, quibus Gal. in methodo medendi passim vtitur, scilicet indicatio, coindicatio, seu contraria indicatio; propria, communis indicatio, simplex indicatio & composita. Tandem indicatio (vtitur Gal. hoc nomine) prohibens, quod nomen multa alia comprehendit quæ diuersa sunt ab indicatione, nam pater, mater, amici, & assistentes interdum prohibent administrationem alicuius remedij, tamen ab his non sumitur indicatio per has enim differentias indicationis explicatas methodus medendi rationalis gubernatur, siquidem medendi methodus, per has indicationes factas, habet principium & finem: principium autem methodi me-

dendi est cognitio morbi; nam indicatio à morbo desumpta optimè methodus medendi appellatur à Gal. 3. *meth. cap. 1.* & hæc indicatio quæ sumitur à morbo non potest exerceri, nisi cognoscamus morbum, vnde necessarium erit medico rationali cognoscere prius morbum antequam inueniat remedia. proinde Gal. multis in locis docet morbi cognitionem esse remediorum inuentionem; finis autem huius methodi medendi, vt testatur Gal. 7. *meth. cap. 7.* est remediorum inuentio facta per indicationes.

Cum igitur inuentio remediorum huius methodi medendi sit finis, operæ pretium erit explicare hac in parte quid sit remedium. Est ergo remedium quicquid corpori admotum iuuat, vt Gal. docet 1. *meth. cap. 1.* quare remedium ad aliquid est, & relationem dicit ad nostrum corpus, si ergo corpori admotum iuuat, remedium est, aliter enim non est remediū, debet ergo aliqua res vt sit remediū duo habere, vt corpori applicetur & iuuet, quare vna & eadem res potest esse remedium, & nocens, si enim iuuat,

iuuat, remedium est: si minus, nequaquam, & inter causas nocentes recenseri debet, quod exemplo sanguinis missionis confirmat: nam si iuuat, remedium est; si autem noceat, causa nocens appellatur. Hæc eadem Gal. explicat *lib. cons. art. med. cap. 14.* ubi remedium appellat quod corpus iuuat dum præter naturam ab bonum habitum reuocat, quapropter cibus, potus, & medicamenta si adnota corpori iuuant, remedia sunt. Horum omnium medicamentorum materiã 4. *sanit. tuend. & lib. de cons. art. med. cap. 14.* reuocat Gal. ad quatuor capita, scilicet ad sumenda, facienda, educenda & forinsecus aduenientia, *lib. vero ad Transf.* ad tria tantum capita reuocat materiam remediorum, scilicet ad victus rationem, medicamenta, & chirurgiam, sub victu comprehendit Gal. cibum, potum, perfusiones, cataplasmata, clysteres, 11. *meth. cap. 15.* ex cibo vero & potu omnes res non naturales intelligimus, vt somnum, vigiliam, morum, venerem, &c. quo fit remedium alia plura comprehendere quæ medica-

mensa non sunt; nam cibus, potus, sanguinis missio, cucurbitulæ, & instrumentum chirurgicum sub remedio comprehenduntur, medicamenta tamen non sunt vocanda; vnde sequitur vt victus à remedio non distinguatur, nam reuera species illius remedij est, quare omnis victus est remedium, non tamen è contra, & proinde decipiuntur aliqui, dicentes vires ex se indicare victum, cum victus sub remedio comprehendatur, vt diximus, si vires indicant victum, ergo indicabunt remedium; quod absurdum est, per se tamen sui conseruationem, & custodiam, vt superius dictum est, indicant.

DE SCOPIS REMEDIORUM.

HÆc omnis remediorum materia habet quatuor scopos, sc. qualitatem, quantitatem, occasionem, & vtendi modum, de quibus quatuor agit Gal. lib. ad Glau. cap. i. quoduis enim remedium necessariò debet habere hos quatuor

tuor scopos, nam remedia non quæuis, sed qualia sint, aut quanta, quauis occasione, vel quouis vtendi modo adhiberi debent.

Sed obiicies; Gal. *in ar. med. cap. 85.* duos tantum scopos recenset, scilicet qualitatem & quantitatem: ergo sibi ipsimet contrariatur. Respondeamus Galenum recensuisse quatuor scopos, quia tunc agebat de morbis curandis, in quibus profligandis necessarij sunt quatuor scopi, in arte verò medica agit de sanitate tuenda, in qua conseruanda non est necessarius modus vtendi, nec occasio; sed sigillatim de singulis agamus, initium sumentes à qualitate.

Per qualitatem remediorum hac in parte non intelligimus primas, secundas, vel tertias qualitates seu facultates medicamentorum, vt aliqui falsò sibi persuaferunt; sed per qualitatem remedij, species, genus, & differentias, vel naturam remedij intelligimus, quæ quidem natura remediorum, vt superius dictum est, ad quatuor capita renocatur, vel ad tria, vt *lib. de op. sec. ad Transf.*

docebat Gal. quæ quidem remediorum qualitas symmetriâ propriâ ab indicatione & à morbo sumitur. Deinde ab indicatione à natura totius vel partis, consuetudine, ætate, & sexu deliberatur.

Per quantitatem remediorum, vint remediorum intelligimus, non tamen mollem, certa enim remediorum quantitas nec linguâ proferri potest, nec calamo perscribi, vt Gal. i. *ad Glau.* docebat, certa reuera artificiosa coniectura metienda est; quantitas verò medicamentorum, vel dicitur alterantium, vel euacuantium, vel quantitas victus; qui etiam sub remedio comprehenditur, vt superius diximus; quantitas medicamentorum alterantium, ex affectu, ex naturâ totius & partis, ex ambiente, ex certâ partis substantiâ, & ex situ partis desumitur; quantitas vero euacuantium medicamentorum ex affectu, viribus tamquam consentientibus, vel prohibentibus, vel ex naturâ totius vel partis, ex ætate, consuetudine, ex ambiente, & ex cõtumaciâ humoris qui euacuari debet, desumitur: pituita enim maiori quantitate

tate euacuantium medicamentorum indiget quàm bilis. Tandem victus quantitas desumitur ex viribus potissimum, ex naturâ, ætate, consuetudine, ex ambiente & morbo prohibente.

Occasio nihil aliud est quàm opportunum tempus ad agendum; quæ occasio duplex est, vna vniuersalis, altera particularis, vt Gal. lib. ad Transf. docet. Vniuersalis occasio est opportunum tempus ad agendum commune omnibus, quæ ex postulantibus auxiliâ & absentia impedientium desumitur. Particularis vero occasio est tempus opportunum ad exercitationem alicuius remedij particularis, quæ desumitur ex particularibus postulantibus auxilium, & particularibus impedientibus, quæ quidem particularia postulantia vel impedientia multa esse solent, quæ particularem occasionem seu particulare tempus ad aliquid agendum variant, desumitur occasio præscribendi medicamenta siue alterantia, siue sint euacuantia, siue victus, siue potus, vel somnus, vel vigilia, ex particulari morbo.

tempore, quæ omnia ex particulari exercitatione remediorum manifesta sunt, vt Gal. docet toto 5. lib. *Aph.*

Per vtendi modum, intelligere debemus rationem administrandi remedium, an semel à nobis, an sæpius illa sint administranda, quâ formâ, quâ substantiâ, cui parti sint adhibenda, & qui sit euacuationis locus conferens, & quæ vena sit secanda, & quories, quæ omnia ex prædictis indicationibus elucescunt.

Cæterùm antequam rationalis medicus remedia per indicationes explicatas inueniat, & ad morbos curandos accedat, prius debet inuestigare an morbos possit curare nec ne: nam si non possunt curari, non sunt præscribenda remedia quæ aliis fuere præsidia, ne à vulgo infamentur, vt 11. *meth. cap. 9.* testatur Gal. Cognoscet verò an morbus possit curari duobus modis, experientia scilicet & ratione, sed experientia longo indiget tempore, proinde satis erit rationem adhibere. Quare deprehendimus ap. morbus sit lethalis vel non ex quibusdam signis, & præcipuè quatuor modis

modis, sc. ex substantiâ partis, actione, usu, & situ partis, vt Gal. docet 3. meth. cap. 1. Ex substantiâ partis, vt si solùm vesica vel membranosa pars septi transuersi vlcerata sit, intelligimus illud vlcus non posse curari: ex actione, vt si cor vulnere affectum sit, non posse curari illud vlcus intelligimus. Ex usu partis etiam id intelligimus, vt si vlcus coniunctum sit cum phlegmone, intelligemus vlcus non posse curari. Ex posita tandem illud intelligemus, vt si renes vulnerati sunt deprehendemus non posse curari, quoniam vis medicamentorum non poterit ad illos peruenire. Libro autem de conser. art. med. cap. 16. Gal. has quatuor notas vel modos ad duo capita reuocat, ad facultatem, videlicet, formatricem imbecillam, & defectum materiæ.

Postquam medicus rationalis ex prædictis notis cognouerit, an affectus curari possit, accedat iam ad remediorum inuentionem ad morbos curandos. Cæterum nota medicum rationalem non curare omnes morbos per indicationes, sed

sed aliquos curat experiētiā, alios analogismo, experiētiā enim curantur, qui totā substantiā nostræ naturæ aduersantur, qui quidem morbi ratione inueniri non possunt, de quorum differentiis non agebat Gal. *lib. de differentiis morborum*, nam ibi tantū agit de his qui ratione inuestigari possunt, quare malè Argenterius aduersus Gal. agit de differentiis morborum qui ratione inuestigari possunt; horum vero morborum curationem qui experiētiā curantur pollicetur Gal. se scripturum *lib. 11. de simpl. med. facul.* Et quāuis medicus rationalis curet morbos aliquos rationali methodo, per indicationes factas, aliquos tamen solā experiētiā, vt diximus, curare debemus, & non est miscenda ratio cum experiētiā, neque è contra: sed seorsum tradenda, quam rem demonstrat Gal. *1. meth. c. 4. 2. meth. c. 6. & 7. & 3. meth. c. 1.*

Analogismo etiam medicus rationalis curat morbos aliquos: est enim analogismus à simili ad simile, vt Gal. *lib. ad Trans. cap. 11. & lib. de subfig. Emp.* vti-
tur vero medicus analogismo seu trans-
situ

situ à simili ad simile in morbis curandis, vt docet Gal. *lib. ad Transf. cap. 10.* quando caussa delitescit & nullam habet obseruationem, sed affectus quàm similis est sensibus, huiusmodi vero affectus non possumus curare per indicationes, quoniam caussa ignoratur, quod exemplo efficaci docet Gal. loco citato, si aliquis à serpente Hæmorrohis vocato demorsus fuerit, deinde sanguis largus effluat, & nos causam cur id patiatur nescientes nec obseruatione aliquâ instructi, auxilium sanguinis profluum patientis scribemus, analogismo, quo medicus morbis curandis (vt dixi) aliquando vtitur. De curatione vero morborum, methodo, & via rationali agit Gal. *lib. meth. & de ar. cur. ad Glau.* Vtimur etiam aliquando epilogismo in morbis curandis. Est autem epilogismus via qua ab affectibus ad causas progredimur contrario modo ac in analogismo, in quo à causis ad affectus progredimur, vt docet Gal. *1. progn. com. 2.* Atque hæc de breui indicationum disputatione sufficiant.

DE

*DE MORBORVM
essentiis, causis & signis.*

EXplicatis breui oratione indicationibus, quæ tantum ad perfectam omnium affectuum curationem pertinent; breuiter etiam hos fructus in manu habebit sua, qui essentias, causas, & signa omnium humani corporis affectuum inquirere voluerit. Quare à vertice capitis vsque ad plantam pedis illos describere aggredior.

Decidentia pilorum.

Est affectio capitis, qua vniuersi eius capilli defluunt.

Causa.

Vna est raritas cutis, & altera defectus alimenti.

Signa.

Raritatis cutis signa cognoscemus. Primo, quia pili qui exciderunt, eandem quam antea habebant crassitiem seruant. Secundo ex causa aliqua quæ præcessit

rare

rarefaciunt cutim, scilicet medicamento calido, aut lotionem aliquam calefaciente.

Signa defectus alimenti colligemus primò ex tenuitate pilorum, secundò ex morbo præcedente, ut febre ardente, tabe.

Morbus Gallicus.

Est morbus totius substantiæ inficiens iecur, & humores in eo contentos.

Causa.

Fit ex venereo congressu ob coniunctam conversationem & calorem, aliquando ob contagionem.

Signa.

Sunt dolores, summa grauitas corporis, colli, humerorum, omnium articulorum, perpetuus cruciatus, vel pustulae in pudendis rubrae, &c.

Achores vel tineæ.

Est affectus capitis tenuissimis foraminibus cutem perforans, quibus glutinosus humor depellitur.

Causa.

Pituita salsa & nitrosa est, vel mixtus quidam

quidam humor, qui partim tenuem sanienem ac mordacem, partim verò crassum succum in se habet.

Signa.

Si humor qui expellitur est tenuis, biliosam dominari sanienem coniicimus, sin crassus & glutinosus, pituitam.

Dolor.

Est actio deprauata sensus tactus.

Causa.

Solutio continui est causa proxima, causa verò remota humor.

Signa.

Manifesta sunt signa doloris.

Phrenitis.

Est delirium continuum cum febre acuta.

Causa.

Est fluxio sanguinis biliosi ad cerebrum.

Signa.

Vigilia, inquires, & post somnum vociferatio, &c.

Le

Lethargus.

Est symptoma in actione principe
læsa.

Caussa.

Fit ex pituita putri irrigante cere-
brum.

Signa.

Somnus, febris lenta, pulsus rarus,
magnus & undosus est, respiratio rara
& imbecilla, obliuio summa.

Vertigo.

Est actio læsa deprauata imaginatio-
nis, quæ rem quietam circumuolui iu-
dicat.

Caussa.

Vna est externa, & altera interna, ex-
terna vt motus in gyrum & vini potio,
interna vel in capite, vel in alia parte,
omnes fiunt à caussa frigida.

Signa.

Manifesta sunt vertiginis signa.

Epilepsia.

Est conuulsio omnium corporis par-
tium non perpetua, cum mentis ac sen-
suum læsione.

Caus.

Caussa.

Fit ab humore crasso obstruente cerebri ventriculos, non omnes, sed secundum aut tertium.

Signa.

Sunt oris spuma, inordinatio linguæ, in accessione ægri statim concidunt & conuelluntur, & nonnunquam stertunt & circumaguntur.

Melancholia.

Est delirium sine febre cum metu & tristitia.

Caussa.

Fit ab intemperie frigida cerebri ex melancholico humore orta.

Signa.

Sunt metus & tristitia, si multum perseverent absque causa manifesta.

Incubus.

Est imaginatio deprauata ex speciebus rei alicuius suffocantis & opprimantis in cerebro motis.

Caussa.

Fit ab intemperie frigida & ficca cerebri

erebri quando fit per proprium affectum,
si fit per consensum, ab obstructione
partium infernarum, vel tumore lienis.

Signa.

Sunt quando ægri existimant se esse
oppressos, ita vt si velint loqui quasi de-
tineantur.

Apoplexia.

Est priuatio sensus & motus in toto
corpore, ob impeditum transitum spiri-
tuum animalium facta.

Causa.

Est quicquid replet cerebri ventres,
ita vt non possit animalis spiritus per-
meare semper: hæc obstructio fit ab hu-
more crasso.

Signa.

Sunt abolitio sensus, nam ægri quasi
mortui viuunt oculis clausis dormien-
tes & stertentes.

Paralysis.

Est priuatio sensus & motus alicuius
partis ob impeditum transitum spiri-
tuum animalium facta.

Causa

Causa.

Fit ab humore crasso & lento aliquos
neruos obstruente, vel ab obstructione
à tumore facta.

Signa.

Sunt admodum manifesta.

Convulsio.

Est motus deprauatus partium ner-
uosarum, quo versus suam originem re-
trahuntur.

Causa.

Fit à repletionem vel inanitionem.

Signa.

Repletionis signa erunt quando sa-
num corripit subito eueniens aut saltem
non multò post morbi initia.

Inanitionis verò signa erunt quando
post ardentes febres euenit & per plu-
rimas euacuationes siue per sudores, de-
iectiones infernas, vomitum, sanguinis
profusiones factæ fuerint.

Tremor.

Est quidam motus contrarius, ex
contrariorum in se motuum successio-
ne proueniens.

Causa

Causa.

Fit ex imbecillitate neruorum.

Signa.

Sunt admodum manifesta.

Ophthalmia.

Est inflammatio membranæ adnatæ.

Causa.

Vel est interna vel externa ; interna, est fluxio sanguinis, quæ fit à plenitudine corporis aut venarum capitis , aut à fluxione humoris acris. Externa, vt sol, fumus , & alia quæ dolorem aut colorem in oculo exercitando fluxionem mouent.

Signa.

Sunt adnatæ rubor, ex oculis lacrymæ manantes, & in maioribus oculi angulis qui ad nasum sunt sordes quædam aceruatae.

Suffusio.

Est additus humor in oculo ad eius actionem non necessarius, imo eam impediens.

Causa.

Est affluxus humoris craffi.

Si

Signa.

Sunt manifesta.

Angina.

Est inflammatio in musculis interioribus faucium.

Causa.

Fit propter nimiam sanguinis copiam & efferuescentiam.

Signa.

Sunt difficilis spiratio, dolor, & febris, ruborque semper tum vultus, tum colli, atque etiam tumor.

Catarrhus.

Nihil aliud est quàm excrementum descendens à capite ad subiecta membra.

Causa.

Vna est intemperies calida vel frigida cerebri, hæc refrigerando cerebrum, illa attrahendo aut fundendo humorem: altera verò est repletio venarum & ventriculorum cerebri, quæ solet fieri à toto corpore.

Signa.

Cùm fit à causa calida signum erit
ægros

ægros circa partes affectas nonnihil caloris sentire, habentque faciem rubram, contra quando fit à frigiditate, nam circa caput & frontem fit distentio, & meatuum obturatio, ita ut vix per nares resonare videantur.

Præcipuum signū est tussis, & habet causas quinque. Prima est humor collectus in aspera arteria, ut in pleuritide & peripneumonia. Secunda humor distillans à capite. Tertia compressio septi transversī. Quarta magna asperitas faucium. Quinta intemperies frigida inæqualis partium respirationi servientium.

Asthma.

Est densa respiratio sine febre.

Causa.

Est humor frigidus, & tuberculum, obstruendo arterias asperas quæ sunt in pulmone,

Signa.

Sunt gravitas sensus, & quædam pu-

C

culenta per sputum reiecta.

Peripneumonia.

Est inflammatio pulmonis.

Causa.

Fit à quocunque humore, sed præcipuè ab humore pituitoso & crasso.

Signa.

Sunt, dolor gravis, febris acuta, difficilis respiratio, rubedo malarum, & pulsus mollis.

Pleuritis.

Est inflammatio membranæ succingentis costas.

Causa.

Fit vel ab humore bilioso, quando scilicet videmus sputum pallidum & flavum, vel pituitoso, quando spumoso,

Medicine.

51

sum, vel melancholico, quando nigrum, vel sanguineo, quando rubrum.

Signa.

Sunt quinque, febris acuta & continua, dolor pectorius, pulsus ferratilis & durus, difficilis & frequens respiratio, & tussis.

Phthisis.

Est exulceratio pulmonis.

Causa.

Fit ex empyemate, id est, suppuracione: fit etiam ex defluxu humoris erodentis & acris.

Signa.

Sunt summa extenuatio totius corporis, nares acutæ, tempora collapsa, oculi concaui, scapulæ alarum more prominentes, tussis, & quod expuitur

fœtidum est & febris hectica.

Palpitatio cordis.

Est dilatatio & compressio eius præter naturam.

Causa.

Est spiritus crassus in eius sinu contentus & exitum quærens.

Signa.

Sunt summus dolor in ipso corde, & velocitas pulsus in causa calida, in frigida verò econtrà.

Syncope.

Nihil aliud est quàm virium lapsus.

Causa.

Sunt omnia quæ dissipant substantiam partium aut spirituum, aut earum euertunt temperamentum, vt venena, magna euacuatio medicamenti purgantis.

Signa.

Signa.

Sunt pulsus languidus & mador vni-
uersalis.

Imbecillitas ventriculi.

Est quædam læsio concoctionis eiuf-
dem.

Caussa.

Intemperies, scilicet cum aliqua pri-
marum qualitatum laborat vel simplex,
vel composita, nuda vel cum affluxu
humoris, vel à nimio cibo vel potu.

Signa.

Si culpa ciborum fuerit, signum erit
grauitas in ventriculo, si à liberaliori
potu, indicium erit fluctuatio.

Singultus.

Est motus ventriculi, quo ad ex-
pulsionem rerum molestarū, aut quan-

§4 *Fructus*
tate aut qualitate mouetur.

Causa.

Fit vel à repletionē, vel ab inanitiō-
ne, vel ab humoribus vellicantibus, &
rebus acri facultate præditis.

Signa.

Manifestum est singultus signum.

Appetentia canina.

Est immodicus alimenti appetitus.

Causa.

Est frigiditas orificij ventriculi, quæ
vel est nuda, vel cum humore acido,
vel est immodica corporis dissipatio.

Signa.

Etiam sunt manifesta.

Cibi fastidium.

Est nullus alimenti appetitus.

Causa.

Causa.

Fit quando suctionis sensus perit,
vel quia suctio non fit, vel quia corpus
non inanitur.

Signa.

Sunt admodum manifesta.

Colera morbus.

Est ventris perturbatio quæ rem mo-
lestantem supernè per os, & infernè per
aluum expellit.

Causa.

Fit à fluxione humoris biliosi & acris
à toto corpore ad ventrem.

Signa.

Est evidens signum excretio per su-
periora & inferiora.

Diarrhæa.

Est immodica excretio aliquius hu-
moris per aluum.

Caussa.

Fit præcipuè ab humore bilioso, vel ab humore pituitoso, vel melancholico: fit etiam aliquando à prauo alimento in ventriculi cauitate iniecto.

Signa.

Sunt colores in facibus iniekti.

Lienteria.

Est affectus præter naturam, in quo celeriter ea, quæ comeduntur, talia deiiciuntur qualia fuerunt deuorata.

Caussa.

Fit ab exulcerationibus & cicatricibus intestinorum, vel à facultatis imbecillitate.

Signa.

Sunt ægros cibum non sentire & malum corporis acquirere, & ructus acidus.

Dy

Dysenteria.

Est sanguinis euacuatio per sedem cum torminibus, ex vlcere intestinorum procedens.

Caussa.

Fit ab humore bilioso vel atrabilia-ri, vel à pituita falsa, aut à medicamento acri.

Signa.

Si sanguis multum permixtus est cum fæcibus, signum est vlcus esse in intestinis gracilibus: si non est permixtus, in crassioribus, id est, iuxta sedem.

Tenesmus.

Est vehemens & inanis conatus ad egerendum.

Caussa.

Caussæ sunt ea omnia quæ facultatem expultricem intestini recti excitant

ad vehementem & continuum motum, qualia sunt quæ irritant & quæ grauant; irritant pituita ibi impacta & vlceris dolor; grauant fæces immodicæ.

Signa.

Sensus grauis, & distentio circum ventrem, & priuata deiection.

Dolor colicus.

Tunc fit quando colon intestinum ex crassis secundum afficitur.

Caussa.

Vna est externa, altera verò interna. Externa, intemperies frigida, vel alimentum, vel aër, aut veneni potio. Interna, intemperies etiam frigida orta ex pituita vitrea, vel calida ex acri humore flatus distendens, aut inflammatio.

Signa.

Si dolor fit à pituita, cum hæc sit
glu

Medicina.

59

glutinosa, infixus erit ita vt perforari videatur intestinum, neque in eo est sitis. Si fit à bile, erit dolor acutus, sitis, oris amaritudo, & præcessit bilis retentio, si ab inflammatione febris ostendet, sicut loci mutatio, distentio cum, qui ortum habet à flatu.

Ileos.

Est affectus Ilei intestini, à quo eorum quæ per aluum excernuntur omnino supprimitur euacuatio.

Causa.

Est magna inflammatio, vel stercus induratum, vel mutatio situs intestini, quæ hernia intestinalis dicitur, vel omnia quæ excrementorum descensum impedire possunt.

Signa.

Signum proprium est nihil per inferna excerni, quod si exitialis est, ster-

cus per os educitur, ex dolore etiam & tumore in regione tenuium intestinorum ipsum deprehendere possumus.

Inflammatio hepatis.

Est tumor præter naturam, siue fiat à sanguine, siue à bile, siue à melancholia, nam à pituita non potest fieri.

Causa.

Sunt humores prædicti.

Signa.

Potest fieri tumor iste vel in parte gibba vel in caua hepatis; si in gibba signum erit ruficula sicca ob septi transuersi compressionem orta, si etiam comprimimus regionem iecoris, dolorem excitatum sentiemus. Si in caua, dolor ad intestina verget, ventriculus vomitu bilioso, & multis ichoribus repleto tentabitur, deiectiones erunt cruentæ, & singultus aliquando apparebit,

Medicina.

61

rebit, quod malum est, quia inflammationis magnitudinem sequitur. Signa communia tam in parte gibbâ quàm in cauâ sunt, grauitas iuguli, pulsus durus, febris acuta, linguæ nigredo & sitis.

Obstructio iecoris.

Hepatis obstructio est morbus in via.

Causa.

Ab vnâ solum causâ fit, nimirum ab humore crasso fluente ad venas ipsius hepatis.

Signa.

Sunt difficilis spiratio, pallor totius corporis, grauitas in hypocondrio dextro & tussis.

Ictericia.

Est effusio biliosi humoris per vniuersum corpus, vbi per bilem tam flauam quàm nigram intelligas velim.

Causa.

Causa.

Est natura quando expellit humorem peccātem ad vniuersam cutim ratione crisis, vel sanguis mutatus in bilem porraceam, vel intemperies calida pectoris multam bilem generans, vel ipsa intemperies totius corporis bilem ex tenui parte generans; vel obstructio iecoris in meatu, qui ex iecore ad vesicam bilem defert, aut illius qui ex vesica eam ad duodenum intestinum expurgat; vel inflammatio iecoris, vel scirrhus iecoris, vel imbecillitas vesicæ bilis, orta ex aliqua intemperie magna propter quam nō rectē attrahit bilem: & denique vel immodica bilis quātitas in vesica coaceruata impediens, quominus (à magna distensione vesica impedita) possit contrahi, quod aliquando in vesica lotij solet accidere.

Signa.

Sunt corporis pigritia, pruritus vni-
uersus

Medicine.

63

uerſi corporis , pallor in facie & oculis;
& vrina pannos linteos tingens.

Hydrops.

Est tumor præter naturam ventris,
aut totius corporis ex actione iecoris
deprauata procedens.

Caussa.

Est intemperies frigida iecoris.

Signa.

Sunt potus ingens desiderium , &
grauitas corporis , & color vitiatuſ ex
viore albicanribus ægris.

Obstructio lienis.

Fit quemadmodum obstructio he-
patis, & est morbus in via.

Signa.

Sunt triftitia , difficultas ſpiritus , &
ſomnus turbulentuſ.

Sup

Suppressio urinae.

Quoties lotium in totum supprimi-
tur, ita ut eo ægrotantes nihil reddant,
dicitur ischuria, quæ vel propriè vel
impropriè sumitur: impropriè pro vri-
næ retentione in qualibet parte sit affe-
ctus; propriè in qua urina in vesicâ con-
tenta non potest excerni.

Causa.

Est obstructio in renibus à lapide,
arenulis, pure, aut humore crasso facta
impediens urinae transitum; vel imbe-
cillitas vesicæ quæ ab intemperie frigi-
da ortum habet, vel angustia meatus
per quem urina excernitur. Huius an-
gustia duæ sunt causæ, præclusio scili-
cet & obstructio; Præclusio fit vel à tu-
more præter naturam, vel à siccitate:
obstructio fit vel à grumo sanguinis, vel
à pure, vel à lapide, ad quam causam
reuocari possunt arenulæ & crassa ex-
crementa quæ communem habent ma-
teriam,

teriam, vel à tuberculo, vel à callo.

Signa.

Sunt manifesta.

Vrina difficultas.

Dicitur dysuria; fit ab iisdem causis
à quibus ischuria, sed remissioribus.

Renum calculi & vesicae.

Fiunt ab humore crasso, siue sit pi-
tuita vel melancholia.

Causa efficiens est calor immodi-
cus, non frigiditas, generatur enim cal-
culus à calore euaporante humidam
partem crassi humoris & reliquam
concrassante, ita ut si ille concretus hu-
mor in renibus vel vesica moram facit,
ab altero augeatur quoad lapidis ma-
gnitudinem ex arenula acquirat.

Dolor summus adest in hoc affectu,
quia renes non sentiunt nisi per mem-
branam, & dicitur nephriticus dolor.

Signa.

Signa.

Sunt vomitus primò pituitæ, & deinde bilis æruginosæ; vrina supprimitur vel guttatim redditur, dolor renum & infixi aculei instar, nullo foris tumore à parte infestat. Crus stupet: quod è directo laboranti reni responderet.

Stillicidium vrinae.

Dicitur in quo parum & frequenter reddimus vrinam.

Causa.

Sunt imbecillitas facultatis retentricis vesicæ, vel vrinæ acrimonia.

Mictus sanguinis.

Causæ sanguinis mictus vel profluuij narium, vel externæ sunt, vel internæ: externæ sunt casus, ictus, &c. Internæ sunt tres. Prima in facultate consistit,

Medicina.

67

sistit, cum scilicet retentrix vasorum fuerit imbecilla, aut expultrix immodicè irritata. Secunda est sanguinis vitium cum peccat |quantitate aut qualitate. Tertia est vasorum noxa, quæ tripliciter contingit, primo cum vas est tenue; secundo cum molle; tertio cum durum.

Diabetes.

Est velox exitus per vrinam eius quod potatum est eodem à sua qualitate non mutato.

Caussa.

Est intemperies renum calida quæ vim habet attrahendi.

Signum.

Est sitis intolerabilis.

Lubrici.

Tres sunt species. Prima, appellan-
tus

tur teretes & rotundi qui in tenuibus generati intestinis, aliquando ad ventriculum ascendunt, vbi humores agitantur varia pariunt symptomata. Secunda, sunt magni, ita vt eandem intestinorum figuram habeant, & dicuntur & appellantur teniæ, hoc est, fasciæ. Alij appellantur cucurbitini, ob figuram quam habent semini cucurbitulæ similem. Tertia, vocantur Ascarides, qui generantur in intestino recto, ad similitudinem lumbricorum generatorum in stercore iumentorum, qui vehementissimos inducunt pruritus.

Causa.

Omnes generantur ab vna & eadem causa, scilicet ab humore pituitoso putrefacto. Causa efficiens, calor est præter naturam excitatus in pituita putrescente, vt Gal. lib. 3. de locis aff. scribit, cum dicit eos à magno calore fieri.

Signa.

Sunt morsus ventriculi, tussis arida
&

Medicine.

69

& non magna, pulsus inordinatus, febris erratica, partes extremæ refrigeratæ, stridor dentium, & nausea, ani pruritus, & nonnunquam fames canina.

Hæmorroides.

Sunt sanguinis euacuatio per venas ani.

Causa.

Fiunt vel ab humore melancholico, vel ab abundantia sanguinis, aut à conatu.

Signa.

Sunt manifesta.

Procidencia ani.

Tunc dicitur cùm extremitas intestini recti foras delabatur, ita ut non lateat visum.

Causa.

Sunt omnia quæ laxant musculos & liga

ligamentum ani, qualia sunt humida
& quæ paralyfim in musculis ipsius ani
inducere possunt, vt frigida & magnus
ad egerendum conatus, qualis tenes-
mum comitari solet.

Signa.

Etiam sunt manifesta.

Vteri procidentia.

Quando uterus ita euertitur vt ex-
terius emineat, fit procidentia vteri.

Causa.

Ex ægrotantis sermone intellige-
tur.

Signa.

Nota sunt & manifesta.

Profluuium mensium.

Quando copia sanguinis menstrui
con

Medicina.

71

conferata pluribus diebus effluit, immodicum mensium profluuium fit.

Caussa.

Fit vel apertione orificiorum eorum vasorum quæ in cauitatem vteri desinunt, vel à sanguine calido & tenui, vel ab expulsionem totius corporis ad venas vteri.

Signa.

Sunt manifesta.

Suppressio mensium.

Tunc fit quoties cùm fluere debent secundum naturam non fluunt.

Caussa.

Fit vel ab angustia venarum vteri à prima conformatione contracta, vel à densitate vteri quæ ortum habet à frigiditate, vel à compressione vasorum vteri, quæ fit aut à tumore præter naturam,

ram circumiacentium partium, aut ab omenti multa pinguedine, vt in obesis mulieribus, vel ab obstructione, quæ fit à crasso, glutinoso, aut multo humore, vel ab intemperie frigida vteri densans vterum, aut sicca eum indurans, vel à robore vasorum vteri, adeò vt quod in-
fluit, non admittant.

Suffocatio vteri.

Cùm vterus vaporis copia ita intenditur, vt modò sursum, modò in latus retrahi videatur, fit suffocatio vteri.

Causa.

Sunt semen retentum genitale, & menstruæ purgationes cessantes.

Signa.

Sunt mentis torpor, pigritia, crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mæstus, & similia.

Mola

Mola.

Est quædam caro inutilis atque informis in vtero mulieris facta.

Caussa.

Fit à coitu, scilicet quando semen viri est imperfectum vel morbosum, etiamsi aliquando possit fieri culpa mulieris.

Signa.

Sunt quæ in prægnantibus reperiuntur.

Hernia.

Fit cùm peritonæum qua parte vasis seminariis peruium est, aut laxatur, aut rumpitur, ita vt aliquid vel in inguina vel in scrotum descendat.

Varia sunt species, cùm humor est in inguine, dicitur bubunocelle, cùm in scroto, ocheocelle; si est intestinalis, dicitur enterocelle; si aquosa, hydrocelle; si

D

à flatu, pneumatocelle, si sit caro, farco-
celle; si ab omento appellatur epyplo-
celle.

Arthritis.

Est dolor articulorum à fluxione hu-
moris factus; morbus ad quem sequitur
est tumor præter naturam articulorum
distendens partes in eis contentas.

Causa.

Fit tumor ab imbecillitate articuli,
vel à fluxione humoris ad articulos.

Signa.

Cognoscitur humor faciens arthri-
tim, ex naturâ ægri, ex colore articuli,
doloris sensu, iuvantibus & nocētibus;
potest etiam fieri à sanguine, sed præ-
cipuè à pituita mixta cum portione bi-
lis, numquam à melancolico humore.

De febribus.

Febris est intemperies calida, in corde
accen

accensa & per vniuersum corpus diffusa.

Febres vel sunt essentielles, vel accidentales: Essentiales sunt illæ quæ ex essentia febris (qui calor est) desumuntur: quæ tres sunt. Prima desumitur ex qualitate caloris. Secunda ex motu. Tertia ex eius subiecto.

Ex qualitate caloris febres dicuntur magnæ aut parvæ, vel propriè loquentes intensæ vel remissæ.

Ex motu pendent illæ febres, quas appellamus, primò mites, deinde incrementales, & alias è conuerso.

Ex subiecto vel materiâ, diuiditur febris in diariam, putridam, & hecticam. Diaria dicitur illa in qua calor accensus est in spiritibus: Putrida in qua, in humoribus, ita vt ex eorû putredine ortus sit. Hæctica verò in partibus solidis in quibus calor factus est, at in humoribus & spiritibus in fieri.

Differentiæ febrium quæ accidentales appellantur, ex accidenti proximo vel remoto sumuntur.

Ex accidenti proximo, cùm ex colore

febrem diuidimus, quia talis in cute efflorescit color, qualis est humor qui redundat, hac ratione Hipp. 6. epid. febris prærubræ, præpallidæ & liuidæ meminit.

Ex accidenti remoto variæ differentia sumi solent, quæ sunt febris longa & brevis, nocturna & diurna, continua & intermittens, & aliæ similes.

De febre Diaria.

Cùm calor præter naturam accensus est in spiritibus, fit febris quæ dicitur diaria.

Quæ vel est exquisita, vel non exquisita.

Exquisita est illa quæ ex calefactis spiritibus ortum habens per spatium vnus diei perdurat, siue fiat à causa interna vel externa, relinquente vel non relinquente affectum.

Non exquisita est illa, quæ ex vaporibus ab humoribus calidis eleuatis fit, quæ media est inter diariam & putridam; communicat enim cum diaria, quia

non

Medicina.

77

non fit ex putredine humorum, neque ex caliditate facta in partibus solidis, cum putrida verò communicat, quia ex calefactis humoribus ortum habet.

Causa.

Semper fit à causa externa, quæ vel est præsens vel non; si est præsens admittit curationem ipsa causa, sin autem nequaquam: causa erit præsens, densitas cutis quando fuit facta à frigore vel à balneo aluminoso. Non erit præsens quando sit ab irâ, exercitatione, à calore solis & similibus.

Signa.

Quædam sunt communia, & quædam propria. Communia sunt urinae concoctio primo intuitu, auctio pulsus in magnitudinem & celeritatem insignem, ita ut frequentia per exteriorem quietem minimè seruet proportionem.

Proprium ac inseparabile signum est, quod contractio non crescat in celerita-

D 3

tem, vel si crescat id minimum est ac cognitu difficile, & parum à naturali pulsu recedens.

Caloris suauitas etiam est signum inseparabile & proprium febris diariæ.

Vrinæ sunt benè coloratæ cum nonnullis suspensis vel nebulis.

Propria dicuntur illa quando præcessit ira, tristitia, timor, curæ, deustio, refrigeratio, lassitudo, ebrietas, & his similia

De febribus putridis.

In omnibus febribus putridis septem affectus reperiuntur, scilicet febris, putredo, prohibita transpiratio, obstructio, humoris multitudo, humoris crassities, & humoris glutinositas.

Febris varias habet causas antecedentes, quædam solùm sunt causæ, vt putredo, & fluxio humoris multi, crassi aut glutinosi; prohibita transpiratio est symptoma & causa putredinis. Hæ febrium causæ aliquando omnes sunt præsentibus, aliquando non: sunt præsen-

tes

tes cū febris est in principio, nam tunc est fluxio humoris, obstructio, prohibita transpiratio & putredo; non autem sunt præsentes omnes cū febris est in aliis temporibus, nam in augmento febrium iam defuit fluxio, sicut in statu fluxio & obstructio non sunt, in declinatione verò sola est putredo (vt in statu) sed iam euacuatur.

Putredo vel est in toto corpore, vel maximis vasis, vt in febre syncho, vel est in vna tantū parte: Hæc vel est cum phlegmone, vel citra phlegmonem: si est sine phlegmone, pars illa quæ obstructionem habet in qua putrescit humor dicitur focus putredinis, si humor putret in toto corpore, febris ex eo orta caret accessionibus, si verò in vna tantū parte, particulares circuitus efficit, simulque febrem continuam, aut intermittentem continuam, si humor putrefactus in foco, ob eius multitudinem, aut facultatis expultricis imbecillitatem, intra vasa continetur; intermittentem verò si propter causas contrarias, per habitum corporis expellatur.

De febre Synocho.

Febris synochos, id est, continens, dicitur illa quæ ex sanguine ortum habet, quæ caret accessionibus vel circuitibus, & vnâ clauditur accessione, quia non habet certum locum affectum, sed multos.

Hæc vel est putrida vel non. Synochos non putris ad diariam refertur, quæ verò putris Synochos dicitur, ortum habet ex putredine succorum vel sanguinis (quod idem est) in omnibus vasis vel maximis & calidis, qualia sunt illa quæ inter alas & inguina clauduntur.

Causa.

Huius putredinis causa solùm est plenitudo.

Signa.

Sunt maxima plenitudo & rubor in cute, vrina crassa & rubra, somnus immodicus, calor magnus, pulsus vehemens,

mens, maximus, celer, creberr, & inæqualis.

Tres sunt differentiæ febris synochi. Prima dicitur acmastica, à Latinis augefcens, quia à principio suæ generationis semper habet accessionem increfcētem; causa est, quia in ea plus putrescit sanguis quàm dissipatur de putrefacto. Secunda dicitur à Græcis Omotonos, cuius accessio semper eundem seruat tenorem, id est, quæ neque diminuitur saltem sensibilibiter, quod prouenit ex eo quod tantum dissipatur humoris putrefacti quantum de nouo putrescit. Tertia à Græcis dicitur Paracmastica, à Latinis decrefcens, in qua accessio semper decrefcit, quia plus dissipatur ex putrefacto sanguine quàm putrescat de nouo.

De febre Ardente.

Febris ardens non distinguitur à continuâ tertianâ, omnes enim fiunt à bile, cum hoc tamen discrimine, quod in febre ardēte obstructio fit à pletora; at tertiana cōtinua ab humore crasso vel glu-

rinoso, & synochos caret accessionibus,
non autem continua.

Causa.

Omnia quæ bilem flauam procreant,
possunt efficere hanc febrem, aër scili-
cet nimis calidus, alimenta acria & ad-
modum calida, vt piper, sinapi, cape,
allia, vinum vetus, & similia, animique
& corporis labores.

Signa.

Sunt, lingua arida, aspera, & nigra,
ventriculi erosio, sitis intolerabilis, vigi-
liæ, capitis dolor, & nonnunquam deli-
rium, & mouentur ægri ferè semper ab
vnâ parte in aliam, deiectiones liquidæ
& pallidæ sunt, quamuis sæpè aluus du-
ra sit, pulsus celerrimus, vrina flaua &
aliquando alba, quæ delirium futurum
significat, fiunt aliquando surdi, & non-
nunquam muti.

De tertianâ exquisitâ.

Tertiana intermittens fit ex bile pu-
treſ

trescente in loco obstructionis: dicitur *in loco obstructionis*; nam bilis flaua tenuis cùm sit obstruere non potest, cùm non sit crassa, multa aut lenta; omnis enim obstructio fit ab humore crasso, multo vel lento.

Causa.

Fit autem febris ex bile hac ratione, quando ab humore crasso aut lento obstructio est in aliquâ venâ bilis adueniens perficit obstructionem, & cùm ipsa abundet, putrefit non diffolata, & hac ratione generat febrem.

Est autem hæc intermittens, quia quando incipit putrefieri bilis in foco putredinis, expellitur extra vasa per sentientia membra, vbi putrefit omnino & facit accessionem, quæ vt plurimum sudore finitur.

Signa.

Sunt in principio accessionis rigor vehemens, & pungens quasi vulnerans, inæqualitas pulsus, accessio duodecim horis terminatur, vrina est similis vrinæ

eius qui febre ardente corripitur.

De tertianâ nothâ.

Tertiana notha vel spuria est febris intermittens, & frequenter fit ex permixtione pituitæ cum bile: nam potest fieri, sed raro à bile vitellinâ, vel à permixtione aliorum humorum crassorum cum bile.

Causa.

Sunt quæ bilem & pituitam simul generare possunt.

Signa.

Incipit cum rigore mitiori & leuiori quàm in exquisitâ tertianâ, licet sit longior horror, sentiatúrque frigus actu: accessio etiam perdurat duodecim horas & aliquando excedit. Sitis in hac est minor & sudor, in ventre apparent obstructions, aliquando in hepate, & aliquando in splene.

De

De febre Quotidianâ.

Febris quotidiana à pituita putrescente ortum habet.

Causa.

Fit à pituita extra venas, singulis diebus accedēs, quę pituita generatur multoties ab alimentis pituitosis, ut sunt pisces, herbæ frigidae, legumina, & sæpe sæpius orium.

Signa.

Sunt pulsus inordinatus & inæqualis, tardus, parvus & debilis, calor non acris, nec sitis, urina alba, aquosa, tenuis vel crassa aut turbulenta. Spatium accessionum est decem & octo horarum, & quietis sex.

De febre Quartanâ.

Quartana febris est duplex, una intermittens & altera continua, omnes fiunt.

fiunt ex atra bile putrescente in venis.

Causa.

Sunt alimenta melancholica, vt falsa omnia, carnes hircinæ, bubulæ, leporinæ, ceruinæ, cochleæ, legumina, animi & corporis labores immodici, & aliarum febrium longitudo, præcipuè si fuerint sine ordine & autumno.

Signa.

Sunt pulsus tardus & in principio accessionis rarus, & durus, in augmento & vigore veloces & frequentes, ægri cutis dura est & densa. Urinæ sunt tenues, albæ & aquosæ.

De febre hectica.

Febris hectica est calor præter naturam habitum corporis occupans.

Æqualis intemperies in omnibus partibus corporis, quoniam in calore mutatae sunt, reperitur: quem calorem habent

bent ac si esset propria natura, & ideo ab ipso non dolēt nec molestantur (hoc autem quo ad sensum intelligere oportet.)

Hectica duplex est; vna simplex, & altera composita; simplex illa dicitur in qua calor factus est in partibus sine humiditatis alicuius consumptione. Composita verò, quæ siccitatem aliquam morbosam habet coniunctam, quam hecticam marasmodem nominamus.

Causa.

Duobus modis fit febris hectica.

Primo sequendo alios morbos, febres scilicet ardentes, diarias, & internas inflammationes.

Secundo incipiendo & statim à principio, quæ similem habet generationem cum diaria ex causa aliqua procatactica, scilicet ira, tristitia, ex cogitatione, aut lassitudine cum vstione.

Hectici palpebras oculorum vix atollere possunt, cutis totius corporis sicca est, impotentia vigilandi eis inest,

car

carnium consumptionē circa tempora habent, ita vt caua appareant, nullum intestinum, nec vlla viscera atque hypochondria retracta ad thoracem admodum videntur.

Pulsus autem gracilis, durus, debilis ac frequens habetur. Denique totius corporis magna consumptio.

De febre Pestilenti.

Pestilens febris, est epidemia perniciofa; epidemia, quia multos afficit, perniciofa verò, quia multos interficit.

Caussa.

Communis est aër ambiens, quo omnes perpetuò vtimur, qui aër calidus & humidus intemperatus, multos homines ad putredinem dispositos afficit suâ prauâ qualitate nobis occultâ.

Signa.

Sunt febris ab initio maxima, quam-
uis

uis sæpè exteriora frigeant & interiora ardeant, capitis grauitas, oris siccitas, vehemens sitis, & vehemens angustia, difficultas anhelitus, vomitus creber, oculorum aspectus toruus ac varius, vigiliæ & deliria, & aliquando propensio ad somnum. Inter istas sunt si post aures aut sub alis aut circa inguina potissimum bubones cum febre parua oriantur, & in aliis etiâ partibus anthrax, & si in collo oritur tumor præter naturam, cerebrum potissimum malè affici ostendit, si in alis cor, si in inguine iecur.

De Exanthematis.

Exanthema nomen commune est ad omnes cutis efflorescentias, sed speciatim per exanthemata variolas & morbillos intelligimus.

Sunt duæ febres, quarum vna synochos est, quæ humorem expellit ad cutem, qui facit variolas, vulgò pigota, & altera tertiana continua, quæ tumores latos, vulgo pallola vel rosa facit.

In his tumoribus est discrimen, nam
mor

morbilli sunt tumores ficci, & non veniunt in suppurationem, benè tamen variolæ in quibus humor statim vertitur in pus, & sic multa vlcera facit.

Causa.

Variolæ fiunt à sanguine putrefacto; morbilli verò à bilioso humore etiam putrefacto.

Signa.

Sunt, dolor dorsi, timor in somno, partium sentientium vehemens punctio, totius corporis pondus, faciei rubor, pruritus nasi, lacrymæ, sanguinis & humorum feruor, frequens pandiculatio, palpitatio, vox rauca, sputum crassum, capitis pondus & grauitas, dolor capitis pungens, oris siccitas, animi perturbationes, cōuulsio & syncopæ, dolor thoracis, & gutturis, & tremor pedum. Atque hæc de affectuum essentiis vel descriptionibus, causis & signis dicta sint satis. Restat nunc ad breuem tractatum de materia medica (qui etiam fructus est medicinæ) accedere.

DE

DE MATERIA
medica.

Ratio curandi morbos per purgationem, antiquis maxime usitata fuit, in quibus quam plurimæ sententiæ proponuntur ab Hipp. in lib. Aph. ad purgationes seu ad usus purgantium medicamentorum accommodatæ; nec solum apud antiquos ex usu fuerunt simplicia medicamenta purgantia, verum etiam & composita, quod etiam ex Gal. variis in locis colligitur, potissimum tamen lib. de compositione secundum locos cap. de Alopecia.

Usus autem sunt syruporum ad humores præparandos ante purgationem, ut docebat Hipp. si pori & meatus ipsius corporis aperiebantur reserati ab obstructionibus, ut melius purgatio procederet, ad quem usum oximel ab antiquis præscribebatur, decoctum similiter origani, tragorigani, & pulegij, & his similia, quæ ad aperiendas obstructiones erant

erant accommodata. Antiquis etiam fuit maximè obseruata coctio ante purgationem; nam sola cocta medicari oportet, scilicet humores concoctos medicandos esse, præcipiebat Hipp. vna dempta turgentia: nam in hac cum coctio expectari non possit, propter pericula quæ subsequi solent ex turgentibus humoribus, statim prima die purgandos esse præcipiebat.

Fuerunt quoque vltius purgantia medicamenta antiquis fortiora & vehementiora minusque correctæ, ita vt cogereantur statim ab eorum exhibitione aquam vel decoctum hordei propinare, vt non detinerentur in parte superiori ventriculi, quæ maximo sensu prædita est, vt colligitur ex Gal. Quos, quibus, & quando purgare oporteat.

Hactamen nostrâ tempestate, quamuis eadem ratio obseruetur, nihilominus tamen aliqua sunt medicamenta purgantia antiquis maximè ignota, quæ clementiora & benigniora sunt, & composita haud dubiè magis correctæ proponantur, idque ex dispositione corporum.

rum veluti coacti sunt medici: similiter etiam in præscriptione syruporum ad alterandos crassos humores, ad tergendos qui lenti sunt & contemperandos qui plus iusto sunt calidi, quamuis humores ipsos attenuare sit necesse, & ad aperiendas obstructions diuersa ratione ab antiquis compositiones fuerunt, & simplicia ex antiquis ferè omnia cognita habebant: atque hac ratione in officinis syrupi perfectè cocti reperiuntur.

Aquæ similiter distillatæ & variæ decoctiones, quæ à medicis indies præscribuntur ex plantis & ex illarum partibus confectæ, quæ omnes ad præparandos humores ex usu solent præscribere; ut melius coctio à natura efficiatur: nam quamuis syrupi vulgò concoquentes appellari solent, non quia ex eo quod coctio ex eis efficiatur, cum opus solius naturæ sit: sed quod iuuent coctionem ad præparandos humores mediâ attenuatione, extersione etiam & refocillando calorem obstructione sublata.

Cogimur etiam hac nostra ætate in decoctione syruporum aliqua medicamenta

menta, tota substantia agētia, permiscere, & fit quotidie in curatione morbi gallici, in quo curādo vnā cum aliis vt præparentur humores lignū sanctū & sarsa perrilla, quæ dicitur similax Indica, solent admisceri potissimum ex usu, vt tota substantia prauam morbi gallici qualitatem corrigant in humoribus & in partibus solidis existentem, vt eo nomine possit humor à natura concoqui & superari, quod etiam spectamus in malignis febribus & etiam in pestilentibus in quibus curandis aliquando vnā cum syrupis permisceri solet confectio hyacinthorum quantitate duarum vel trium drachmarum, præcipiendo vt optimè agitetur, quod fit etiam eo consilio, vt praua qualitas corrigatur, quod similiter in febribus pestilentibus fieri solet permiscendo drachmam vnā vel duas theriacæ magnæ tamquam alexipharmaci communis omnibus venenis accommodati.

Hac ratione etiam aliqua medicamenta purgantia cum syrupis propinare solent, vt sunt folia senæ, fumaria, epythimus,

rhinus, sthecados flos, & similiter alia,
hæc tamen humorum coctionem non
impediunt, vt quibusdam visum fuit:
non enim in ea quantitate apponuntur,
vt possint humores attrahere, suâ quali-
tate occultâ; sed cùm omnia medica-
menta purgantia calida sint & sicca, &
ex eo vim habeant attenuandi humores
si in minimâ quantitate assumantur, hoc
solum efficiunt vt multo melius quàm
alia medicamenta præparantia humores,
non solum à totâ substantiâ humores
respiciant, verum etiam à manifestâ
qualitate, cùm similem habeât naturam
cum humoribus, vnde permixta cum
aliis medicamentis melius attenuant pec-
cantes humores ob prædictam causam.

Citra coctionem non esse purgatio-
nem exercendam omnibus notum est,
neque hac in re diutius immorandum
est, nam non erit medicus naturæ imi-
tator, à qua nunquam recta ratione eua-
cuatio fieri debet nisi præcedat coctio
humoris, & separatio utilis ab inutili.
Præterea molestâ haud dubiè fiet eua-
cuatio, si crudo existente humore, pur-
gans

gans medicamentum exhibeatur, utilis enim humor violenter educetur & per loca superuacanea & per partes in quibus ab obstructione viæ sunt impeditæ: vnde molesta fiet euacuatio, in qua vires prosteruntur, neque aliquid effatu dignum ex humoribus duci potest: sunt enim tanquam excrementa, symptomaticæ euacuationes initiis morborum factæ, quæ etsi à natura fiant, à medico sunt cohibendæ, ne forsan dicta incommoda sequantur, quod indices à medicis observatur. Verum non solum humorum concoctio expectanda est ad purgationem; verum etiam viæ apertæ esse debent, & hoc est quod Hipp. dicebat 2. *Aph. sent. 9.* Corpora cum quis purgare volet, eò fluxilia facere oportet, quod nihil aliud est quam meatus aperire, per quos transmittuntur, & attrahuntur humores, tum etiam & humores incendere & attenuare ubi crassi, & tenaces fuerint; nam tunc purgatio in omnibus rectè procedet quod in principio cruditate existente fieri est impossibile, observe etiam quæ à Gal. traduntur circa hanc doctri

doctrinam 1. *Aph. com.* 24. nec mirum videri debet, quod humores transmittantur & attrahantur, nam à natura expellente & à medicamento trahente fieri solet purgatio, vt ex Gal. colligitur.

Hac etiam nostra ætate post purgationem altero die decoctum hordei exhibere solent eo consilio, vt si aliqua portio medicamenti fuerit detenta in parte superiori ventriculi ad fundum feratur, quod optimè fit cùm hordeum abstergendi vim habeat, vbi potissimum cum cortice fuerit decoctum; nec melatet ab Hipp. statim à medicamento purgante dictum decoctum propinari, vt colligitur ex 2. *acutorum sent.* 25. & ex Gal. *Quos quib. cap.* 7. neque id etiam citra rationem, nam his temporibus medicamenta (vt antea dicebamus) quæ habent facultatem purgandi, mitiora sunt & benigniora quàm tempestate Hipp. & magis correctæ, verùm quamuis ventriculo inimicæ sunt, non ita ventriculi orificium afficere solent, vt antiquitus fieri solebat, quo tempore vehementiora erant & minus correctæ, vt

E

indicant pilulæ Cochix à Gal. traditæ
1. *de comp. sec. locos, & 5. meth.* quare cùm
ventriculo infestissima essent, ne fortè
illius orificium offenderetur, cùm ex-
quisito sensu præditum sit statim à me-
dicamento decoctum hordei (vt dictum
est) propinabant, neque hoc in omnibus
propinari debet: nam post potionē hie-
ræ scilicet Gal. non est quod secundo
die dictum decoctū propinemus: quam-
uis enim in ventriculo detineatur, ne-
quaquam nocet, cùm familiare medica-
mentum ventriculo sit; habet enim fa-
cultatem roborandi ventriculū ob aro-
mata, quæ illius ingrediuntur compo-
sitionem, verum etiam excalescit pitui-
tam & attenuat, si aliqua illius portio in
ventriculo detineatur.

Sunt & purgantia medicamenta ma-
ximo cum consilio præscribenda: turpis
enim est calamitas, vt dicebat Hipp. da-
to medicamento purgante hominem
occidere; verum obseruanda erunt non
solum exactè vsitata medicamenta quo-
rum vires experimento cognoscuntur
quod maximè exitiales sint, verum etiā
vsitata

usitata quantitas, ab experimento similiter cognita, obseruandum venit, non solum in compositionibus, verum etiam in simplicibus medicamentis, ne forsan modum excedamus in purgatione, ne alienum humorem à peccante educamus. In quibus omnibus ætas, regio, anni tempus, natura ægri, & consuetudo, obseruanda simul sunt: nam in calidâ naturâ, in regione calidâ, & reliqua calida, non licet vti fortioribus medicamentis, & multo magis mitioribus, in quibus vitale robur est imbecille. Eadem ratione purgantia medicamenta ex quacunque licet leui occasione non sunt præscribenda: corpora enim sana difficulter ferunt medicationes, vt docebat Hipp. nec parum à medicamento purgante offenduntur.

QVO ANNI TEMPORE purgare liceat.

NAm quamuis Hipp. tempore veris id fieri præcipiebat 6. *Aph. sem. 47.* & difficulter posse mediâ æstate, nimi-

rum in diebus Canicularibus, 4. *Aph. sent. 5.* tamen cautè intelligendus est, neque enim solummodò docet, purgationem vtilem esse hominibus tempore veris, sed tantùm in iis in quibus ad præcautionem illam adhibemus, ne scilicet incidant in morbos aliquos, vt rectè interpretatur Gal. *in comm.* multoque minus in totum prohibet purgationem in Cane & ante Canem, quia est in mediâ æstate, quamvis difficilius esse affirmet hoc tempore quàm aliis anni temporibus ob causas à Gal. traditas *in comm. dictæ sententiæ*, quod verum est: hoc vnū existit, non esse exercendas purgationes tempore æstatis, quemadmodum nec tempore hiemis nisi multum vrgeat necessitas, nā quæ ad præcautionem fiunt, semper tempore veris faciendas esse moneo cum Hipp. In æstate autem ad mediam noctem, exhibenda esse purgantia medicamenta hortor, vt possint egrotantes horâ nonâ ante meridiem cibum capere, & hac ratione minori cum difficultate euacuatio succedet: sunt enim difficiles purgationes hoc tempore ob
ambien

ambientis aëris caliditatem, à qua cùm
exterius ad habitum corporis attrahan-
tur medicamenta, contrarius fit motus
humorum, nam à medicamento attrahi-
tur interius, atque ideo multo facilius
succedit euacuatio sumpto medicamen-
to anteaquam vrgeat calor; & contraria
ratione tempore hiemis propinare de-
bemus, ne forsan ægrotantes in cubicu-
lo frigido detineantur: retardatur enim
à frigiditate purgatio, neque potest idem
medicamentum ita facile in actum re-
duci, neque natura tam facile humorem
expellere, vt in ambiente calido. Ali-
quando maximi momenti sunt panni
linnei calefacti, quorum vsus maximè &
vtiliter probatur si apponantur ventri-
culo; neque est diuertenda natura à uâ
actione simul adhibito medicamento
purgante, idque vel cibo, vel viâ, vel
coitu, quod omnium deterrimum est in
die in quo exerceatur purgatio, sequen-
ti etiam & tertio.

DE FORMIS MEDICAMENTORUM PURGANTIUM.

Purgantia medicamenta sub variâ formâ hac nostrâ ætate præscribuntur, nam exterius applicata ad humores educendos sunt idonea, quæ solent præscribi in formâ vnguenti, vt est vnguentum Arthemisiæ seu de mercurio confectum; quibus si vngatur ventriculus, solent sequi deiectiones multæ, potissimum ex dicto mercurio, vt indies fieri videmus in iis qui ob inueteratum morbum Gallicum dicto vnguento curantur, nam vbi in animo est, quod per secessum aliqui humores educantur, sufficit in iis simul prompta vnctione cum paucò vnguento in regione ventriculi manum apponere ad id vt aluus solvatur, quod similiter fit vnguento de Arthanita, istarum tamen euacuationum modus his in temporibus non valdè probatur.

Solent interius medicamenta præscribi in formâ solidâ & liquidâ: in formâ

mâ solidâ per pilulas quæ cataputia à Gal. dicuntur, in formâ liquidâ per portiones & opiatas dictas.

Est autem pilularum forma, quædam compositio, quæ paucis cum liquore paratur, videlicet syrupo aliquo, longo temporis spatio in officinis seruatur, ut possint minori quantitate præscriptâ purgationes fieri: verum fit ut medicamenta purgantia sub pilularum formâ, minus sint corrigentibus mixta.

Est autem pilularum quantitas quæ pro vna vice exhiberi solent à ʒ. j. ipsius massæ ad ʒ. iiij. quod est ʒ. j. & ʒ. j. ita tamen ut si forsan quod maiori ex parte fieri solet duæ massæ pilularum præscribantur ex vnaquaque ʒ. ʒ. vel ʒ. ij. accipiendas esse erit præscribendum addito diagridio vel scammono cocto, quantitate gr. iiij. usque ad gr. v. in robustis, ut illius beneficio acutis medicamentis tribuatur, quæ cum in formâ solidâ diutius seruentur, solent vim suam aliquâ ratione remittere. Cum pilulis etiam est præscribendum parû aquæ stillitiæ fœniculi vel stæcados, dum in animo est

caput purgare, quæ quamuis in exigua quantitate sit, non parum conducere videtur in acceptione medicamenti. Erit autem ipsarum pilularum forma in vna dosi sequens.

℞. massæ pilul. aggreg. & de fum. terre añ. ℥. ij. diagr. gr. iij. cum aqua fœniculi, fiant pil. nu. xj. & deaurentur.

Solent aliquando pilulæ ad vsum præscribi, vt per epicrasin, & sensim educantur humores, & tunc de tertio in tertium, vel de quarto in quartum tres sunt præscribendæ, pro vnaquaque dosi; erit autem earum descriptio sequens.

℞. massæ pil. aggr. & fœtidarum añ. ℥. ij. cum aq. fœn. fiant pil. num. xij. adde vnicuique per se gr. j. diagredij, & deaurentur.

Hæc eadem forma in reliquis pilularum massis seruanda erit, nam variæ sunt illarum compositiones pro variâ humorum naturâ quos attrahere debent.

Erit autem tempus ad pilulas exhibendas nocte mediâ, præcipiendo vt dormiant ægri, nam cum hæc medicamenti forma solida sit, maiori indiget calo

calore, cùm in quiete scilicet in somno melius in actum redigantur, postquam verò iam per aluum, vel per os, humores euacuari inceperint, ne euacuatio impediatur in vigiliâ detinendi sunt ægròtantes.

Sunt qui existiment pilulas magis conducere ad educendos humores ex partibus longinquis; neque id citra rationem: nam cùm non possint citò in actum reduci diutius detentæ in ventriculo ex longinquioribus partibus valent humores educere, atque ideo ad capitis affectus, oculorum, &c. pilulæ potius sunt præscribendæ quàm potiones.

Nec me latet hieram diacoloclyntidos dictam potentissimum esse remedium ad humores educendos ex cerebro, cæterum ob illius saporem ingrattissimum, quantum fieri poterit ab illius usu abstinendum moneo, tum etiam & quia ventriculo contrariatur, quod indicat temporis diuturnitas in illius actione: longissimo enim tempore in actum reducitur, quod signum est non posse ab ipso superari.

DE LIQVIDIS medicamentis.

Solent medici in formâ liquidâ purgantia medicamenta exhibere, & ipsa dissoluuntur cum decocto communi dicto; ita vt potionis quantitas non excedat ℥.vj. quæ est quantitas vnius quadræ: erit autem purgantium medicamentorum quantitas vsque ad ℥.xv. ad summum pro vna dosi.

Est autem aduertendum per purgantia hoc loco non esse intelligenda simplicia, sed composita, id est, compositiones quæ vulgò laxatiuæ dicuntur, quarum non exigua est sylua in officinis ad omnes humores educendos parata; in quibus sunt purgantia medicamenta multum correctâ; vt possint citra noxam suas actiones exercere. Solent ferè semper dictis potionibus permiscere syrupum rosarum Alexandrinarum ex nouem infusionibus, qui, licet ad bilem educendam commendetur, habet facultatem educendi omnem crassam humiditatem.

ditatem, & potissimum sanguinis serum,
quare fit ut à medicis in omnibus ferè
portionibus præscribatur, tum etiam &
quia gratissimum est medicamentum
inter purgantia si quod aliud, & quia
eius dosis est ab ℥.j. usque ad ℥.iiij. ob-
servandum etiam erit quod vnaquæque
℥. huius syrupi idem præstat quod ℥.ij.
alterius confectionis laxatiuæ, atque id-
eo si in animo fuerit potionem aliquam
præscribere in qua ingrediantur ℥. iiij.
huius syrupi, adnumerandæ sunt alterius
confectionis ℥.vj. ita ut nō excedat nu-
merum ℥. xv. omnium medicamento-
rum quantitas, & quando in animo est
in modum opiatæ dictas confectiones
propinare pro vnaquaque dosi coclea-
rium vnum vel duo sunt præscribenda.
Est autem pro vnaquaque ad potionem
præscribendam sequens schedula:

℥. conf. med. hamec & diaph. añ.
℥.iiij. syr. ros. alex. ex 9. infus. ℥.iiij. de-
cocti communis q.s. misce & fiat potio.
In pueris præter id quod in exigua
quantitate sunt præscribenda medica-
menta, observa quod in schedulis scribi-

tur ad finem, fiat potio parua, nam si magna fuerit difficulter propinari solet.

Opiatarum vero descriptio sequens sit.

℞. conf. medic. hamec & diaphæn. añ.
℥.ij. syr. ros. alex. ex 9. inf. q. s. misce &
fiat in modum opiatae.

Similiter ex aliis medicamentis fieri debet, quia ad multas dies præscribi debent, atque ideo non permiscetur decoctum, ne forsan corrumpantur, & ut diutius seruentur.

In opiatis verò & confectionibus solent permisceri aliqua simplicia medicamenta purgantia, ut Rhabarb. Agaricus, Turbith, & aliquando Helleborus niger: verum obseruandum venit quod ex dictis in vnaquaque potione ℥.j. sufficit usque ad ℥.ij. dempto helleboro & turbith, quorum ℥.j. quantitas sufficiens plus iusto permittitur, & vna cum his medicamentis quæ ad illa corrigenda veniunt, valent in eadem scilicet quantitate, vel dimidia, ut est zinziber, quod est Agarici, & Turbith correctiuum, spica nardi quæ corrigit Rhabarbarum, &
his

his similia. In opiatis verò pro vnaqua-
que ℥. j. confectionis sufficit ℥. j. dicto-
rum medicamentorum adhiberi, ita ut
ad ℥. iiij. confectionis sufficiant ℥. iiij.
quod si medicamētum fuerit ingratum,
ut est hiera diacolocynthidos (si fortas-
se aliquando præscribenda venit) per se
sola præscripta vel cum Helleboro ni-
gro, tunc loco syr. ros. alex. ex 9. inf.
syrup. ex cort. citri permisceri de-
bet, in potionibus ab ℥. j. ad ℥. ij. in
opiatis verò q. s. ut liquida fiat confe-
ctio, ut magis grata ventriculo fiat, nam
dictus syrupus non parvam habet cum
ventriculo familiaritatem.

DE TORREFACTIONE *medicamentorum purgantium.*

Aliquando solent medici medica-
menta purgantia præscribere eo
consilio, ut comprimendo euacuent, ita
ut euacuatio sic fiat, ut non multum ir-
ritetur natura; quod fieri solet maiori
ex parte in dysenteria & diarrhæa, idque
potissi

potissimum quando præscribitur Rhabbarum & mirabolani, in quibus non solum ad purgationem, verum etiam ad comprimendum, facultas reperitur. Tunc igitur, ut melius id fiat, solent medici prædicta medicamenta torrefacere; media enim torrefactione purgatoria facultas exhalatur, & ex compressione minuitur, cum in substantia tenui & calida existat. Hoc autem dupliciter fieri solet, nam aut multum torrefiunt aut parum, multum torrefiunt, quando animo est magis cohibere euacuationem quam ipsam prouocare, ut in dysenteria & diarrhæa immodica existente euacuatione, & in hoc etiam est discrimen, nam ubi multum torrefiunt dicta medicamenta lauanda sunt in aqua plantaginis, ut amittant empirrheuma ab igne susceptum; quando vero parum torrefiunt dicta medicamenta non est necessaria lotio, cum exigua caliditas sit introducta.

Sint itaque dictorum medicamentorum exempla sequentia.

℞. Cort. mirab. citrinorum & chæbulorum

bulorum añ. ʒ. ij. Rhab. ʒ. ʒ. torrefiant,
syr. ros. siccarum ʒ. j. aquæ arnoglosæ
q. s. misce & fiat potio.

Alia potio cum lotionē.

℞. Cort. mirab. citr. & chæbul. añ.
ʒ. ij. Rhab. ʒ. ʒ. torrefiant multum & la-
uentur in aq. plantag. syr. ros. siccarum
ʒ. j. aq. plant. q. s. misce & fiat potio.

*DE SIMPLICIBVS ME-
dicamentis. Potiones purgantes.*

Possumus etiam præscribere potio-
nes purgantes ex solis simplicibus me-
dicamentis, hoc modo.

℞. Agarici trochiscati recenter cum
oxymellite ʒ. ij. turbith opt. & electi
ʒ. j. vini albi generosi ʒ. j. zinziberis
ʒ. ij. decoct. communis q. s. misce &
fiat potio.

℞. Rhab. electi infusi per hor. xij. in
aq. endiuix & optimè expressi ʒ. ij. con-
fect. diaphæn. & Elect. ij. de succo ros.
mesuæ;

mesuæ añ. ʒ. iij. syr. ros. alex. ex 9. inf.
 ʒ. ij. decocti communis q. s. misce &
 fiat potio.

Hoc tamen vnicè observandum est
 quod scammonium & diagridium num-
 quam ingrediuntur in aliqua ex dictis
 potionibus ob illius vim & effrænem
 qualitatem, vt impiè fieri solet à quibus-
 dam Pharmacopæis non citra magnam
 perniciem & medicorum peritorum in-
 famiam. Iam ad simplicia & composita
 medicamēta accedere tempestivum est.

SIMPLICIA MEDICA- menta bilem purgantia.

Rhab. quantitas à ʒ. β. vsque ad ij.

Scammonium } quantitas à gr. iij. vsque
 Diagridium } ad. v.

Aloës — } à ʒ. j. vsque ad ʒ. iij.

Tamarindi. } à ʒ. j. vsque ad ʒ. iij.

Mirob. Citrini. — à ʒ. j. vsque ad ʒ. iij.

Cassia fist. } ab ʒ. j. vsque ad ʒ. ij.

Manna

COMPO

COMPOSITA MEDICA-
menta bilem purgantia.

Syr. ros. alex. ex 9. inf. ab 3. ij. ad iiij.
 Elect. de succo ros. — à 3. j. ad vj.
 pilul. aggreg. — à 3. ß ad 3. iiij.
 pilul. cochia Gal. — à 3. j. ad 3. iiij.
 pilul. de Rhab. — à 3. j. ad 3. iiij.
 pulueris hiera 3. Gal — à 3. j. ad v.
 pilulæ de hiera 5. Gal. — à 3. j. ad iiij.
 Conf. diapr. sol. }
 Conf. diacatol. } — à 3. j. ad vj.
 Conf. hamec. }

SIMPLICIA PURGANTIA
pituitam.

Agaricus } — à 3. j. ad ij.
 Thurbith }
 Mirobol. cheb. — à 3. j. ad iiij.

COMPOSITA PITUITAM
purgantia.

Elect. de diacarth. }
 Conf. diaphænic. } — à 3. j. ad vj.
 1 Elect.

Elect. ind. maius & minus }
 Hiera diacol. Gal. absque } — à ʒ. β. ad v.
 Elleboro & Scammon.

pilul. aggregatiuæ }
 pilul. de Agarico } — à ʒ. j. ad iij.
 pilul. cochiae Raz. }
 pilul. cochiae Gal. — à ʒ. β. ad j.

SIMPLICIA PURGANTIA

succum melancholicum.

Elleborus niger — à ʒ. j. ad iij.
 Fol. senæ in infus. — à ʒ. β. ad j.
 Mirab. indic. — à ʒ. j. ad iij.
 Serum caprinum — à ʒ. j. ad vj.

COMPOSITIO PURGANTIA

succum melancholicum.

Confect. hamec } à ʒ. j. ad vj.
 confect. diasenæ }
 pilul. aggreg. } — à ʒ. ij. ad iij.
 pilul. de fum. ter. }
 pilul. de lap. laz. — à ʒ. β. ad j.
 pilul. lucis minoris — à ʒ. ij. ad iij.

S A

SANGVINIS SERVUM
educientia.

℞. ros. alex. ex 9. infus. à 3. ij. ad 11. ij.

narindi } ——— à 3. j. ad ij.
silia ——— }

Ex dictis compositis medicamentis
gantibus, possumus præscribere se-
ntes formas.

TIO AD PURGANDAM
bilem.

℞. Elect. de succo ros. & diapr. sol.
3. v. syr. ros. alex. ex 9. infus. 3. ij. de-
ti communis q. s. misce & fiat potio.

Ad idem pilula.

℞. massæ pilul. aggr. & de Rhab. añ.
j. diagr. gr. 11. ij. cum aqua fœniculi,
t pilulæ numero xj. & deaurentur.

AD

Ad idem opiata confectio.

℞. electuarij de succo ros. ʒ. j. cat. fistulæ recenter extractæ per enapotionem, & diapr. sol. añ. ʒ. j. β. syr. alex. ex 9. inf. q. s. misce & fiat cco opiata, ad vsum dos. à ʒ. j. ad ij.

POTIO AD PURGANDAM
pituitam.

℞. elect. de diacartamo & diaphl. añ. ʒ. v. Agarici recenter troch. c oxym. ʒ. ij. syr. ros. alex. ex 9. inf. ʒ. decocti cōmunis q. s. misce & fiat po

Ad idem pilula.

℞. massæ pil. aggr. & de Agarico ʒ. ij. diagr. gr. v. cum aq. fæn. fiant pil. num. xj. & deaurentur.

Ad idem opiata.

℞. conf. diaphæn. & elect. de

Medicina.

117

h. añ. ʒ. j. Agar. recent er troc. cum
m. ʒ. iiij. zinzib. ʒ. j. Syr. ros. alex. ex
f. q. f. misce, & fiat conf. opiata ad
m à ʒ. j. vsque ad ij.

*TIO AD SVCCVM
melancholicum educendum.*

℞. conf. diasenæ & hamec añ. ʒ. v.
ros. alex. ex 9. inf. ʒ. iiij. decocti
munis q. f. misce & fiat potio.

Ad idem pilula.

℞. massæ pil. aggr. & de fum. ter. añ.
diagr. gr. iiij. cum aq. fæn. fiant pilu-
lum. xj. & deaurentur.

Ad idem opiata.

℞. conf. diasenæ & hamec añ. ʒ. ij.
senæ puluer. ʒ. iiij. syr. rosarum alex.
9. inf. q. f. misce & fiat conf. opia-
tum vsum à ʒ. j. vsque ad ij.

his facile est, vbi est in animo duos
plures humores euacuare compo-
tum

tum medicamentum constituere siue
forma solida vel liquida.

*PILVLAE AD EVACVANDAM
bilem & pituitam.*

℞. massæ pil. aggr. & de Agarico
℥. ij. drag. ʒ. iiij. cum aq. fæn. fiant pilu-
lum. xj. & deaurentur.

Ad idem potio.

℞. elect. de succo ros. & diacart-
mi añ. ʒ. v. syr. ros. alex. ex 9. infus. ʒ.
decocti communis q. s. misce &
potio.

Ad idem opiata.

℞. conf. diapr. sol. & elect. de dia-
thamo añ. ʒ. ij. syr. ros. alex. ex 9. infus.
q. s. misce & fiat conf. opiata ad vsum

POTIO AD BILEM ET
pituitam educendam ex ventri-
culo & primis venis.

℞. conf. hieræ s. Gal. ʒ. v. Rodome-
is s. ʒ. j. decocti hordei & fæniculi
s. misce & fiat potio. Aliquando ad-
datur solet ʒ. j. Agarici, ubi magnæ pituitæ
copia in ventriculo & primis venis con-
tinetur, idque trochiscati cum oxyme-
re.

Ad idem ubi adiuncta fuerit
febris.

℞. pulueris hieræ s. Gal. & cassiæ
st. præparatæ añ. ʒ. iij. Rodom. s. ʒ. ij.
decocti hord. & fæn. q. s. misce & fiat
potio.

Medicamenta facultatem habentia
macuandi (vel vt melius dicam lenien-
) humores in primis venis contentos
nulla indigent præparatione ad hoc
suas agant operationes. Quæ autem
indigent alteratione vel præparatione
sunt

sunt reliqua purgantia medicamenta, præterquam illa quæ torrefacta propinari debet. quare quæ ante expulsionem veniunt præscribenda, his medicamentis tam simplicibus quàm compositis præparari solent.

SIMPLICIA PRÆPARANTIA BILEM.

Endiuia.

Acetosa.

Viola.

Plantago.

Portulaca.

Chicoreum.

Buglossa.

Rostrum porcinum.

Nenuphar.

Hordeum.

Ex his aquæ stillitiæ vel decoctiones fiunt.

Compo

Medicina.

121

Composita ad idem.

Syr. Borriginis.
Violarum.
Ros. viridium.
De succo Rosarum.
Endiuia S.
Endiuia C.
Cichorij.
Agrestæ.
Granatorum.
Acetositis citri.
Limonum.
Acetosæ S.
Oxizachar.
Rob. de Ribes.

*SIMPLICIA PRAEPA-
rancia pituitam.*

Feniculum.
Apium.
Absinthium
Mentha.
Pulegium.
Satureya.

F

Fructus

Sabina.

Maiorana.

Salvia.

Origanum.

Rad. Asparagi.

Rad. petroselini.

& rad. pæonia.

Composita ad idem.

Syr. Acetosus.

De duab. rad.

De v. rad.

De sthecad.

De mentha.

Oxim. S.

Acetosus. C.

Oxim. C.

Oxim. schil.

Rodomel S.

*SIMPLICIA BILEM**atram preparantia.*

Melisa.

Borrage.

Bugle

Medicine.

123

Buglossa.

Fumusterra.

Lupuli.

Absinthium

Maiorana.

Scolopendria.

Cap. veneris.

Tamariscus.

Flores genistæ.

Composita ad idem.

Oxim. S.

Syr. Borruginis.

Buglossæ.

Fumiterræ.

De bisantiis.

De epithimo.

De scolopendria.

Regis sapor i. de pomis.

& est valdè efficax.

F 2

DE MEDICAMENTIS
respicientibus propria
membra.

Caput respicientia.

Melissa.

Bethonica.

Ros marinum coronarium.

Mel rosarum.

Maiorana.

Thus.

Syr. de sthecad.

Thoracem respicientia.

Cap. Ven.

Hyssopus.

Salvia.

Scabiosa.

Syr. de Hyssopo.

Violarum.

Liquiritiæ.

De

De prasio.

De calamentha.

Cap. Ven.

Oxim. S.

Oxim. C.

Oxim. schill.

Sed non utimur oximeli composito
nec schillitico & de prasio, nisi in hu-
moribus valde crassis & viscidis, quia
vehementissimi sunt.

Respicientia ventriculorum.

Absinthium.

Cuscuta.

Semen fœniculi.

Mel ros.

Cinnamomum.

Hordeum.

Syr. de Mentha.

De Absinthio.

De liquiritia.

De cort. Citri.

Respicientia iecur.

Cicoreum.

Eupatorium.

Absinthium.
 Cuscuta.
 Oxim. S.
 Oxim. C.
 Syr. de Absinthio.
 De Eupatorio.
 Buglossæ.
 De Thimo.
 De Calamintha.
 De Chicoreo.
 De Endiua.

Respicientia renes.

Rad. asparagi.
 Rad. saxifragiæ.
 Rad. fæniculi.
 Ciceres nigri.
 Syr. de duabus rad.
 Syr. viol.
 Oxim. S.
 Oxim. C.

Vterum respicientia.

Arthemisia.

Melisa

Melissa.

Nepta.

Fæniculum.

Oxim.S.& C.

Syr.Arthemisiæ.

De rub.tinctorum.

Cap.ven.

*DE MEDICAMENTIS
concoquentibus bilem flavam.*

In capite.

Syr.Rosarum.

Nenuph.

Papaueris; cuius usus non est ita
rutus.

Acetosæ.

Citroniorum.

Myrtil.

De succo agrestæ.

De succo rosarum.

Aquæ lactuæ.

Nenuph.

Rosarum.

In thorace.

Syr. violarum.

De iuiubis.

Liquiritiæ.

Papaueris.

Cap. Ven.

Aquæ violarum.

Portulacæ.

In corde.

Syr. de succo agrestæ.

Acet. Citri.

Iulep. Rosarum.

Aquæ acetosæ.

Buglossæ.

Borraginis.

Rosarum.

In stomacho.

Syr. Acetof. S.

Granatorum.

Rosarum.

Oxi

Medicina.

129

Oxizach.

Miuæ Citoniorum.

Aquæ Citoniorum.

Acetosa.

Portulacæ.

Violarum.

In hepate.

Syr. endiuia S. & C.

De Cicoreo.

Acet. S. & C.

Acetof. Citri.

Aquæ endiuia.

Acetosa.

Cicorei.

Portulacæ.

DE MEDICAMENTIS
conquentibus pituitam.

In capite.

Syr. de Betonica.

De Stechade.

Aquæ Betonicæ.

F 5

Maiorana.

Salvia.

Roris marini.

In pectore.

Syr. Cap. Veneris.

De Hyssopo.

De Prasio.

De Calamentho.

De Liquiritia.

Aqua Cap. Ven.

Scabiosa.

Scolopendria.

Marrubij.

Thymi.

In stomacho.

Syr. de mentha.

De Absinthio.

Mel. ros. colatum.

Aq. Absinthij.

Mentha.

Feniculi.

Ruta.

In

In hepate.

Syr. de duab. radicibus.

De quinque radicibus.

De Eupatorio.

De bisantiis.

Aquæ Eupatorii.

Prassij.

Hepaticæ.

In renibus.

Syr. de duab. & quinque rad.

Oxim. compositum.

Aquæ Erucae.

Cicerum rubr.

Nasturtij.

In matrice.

Syr. Artemisiæ.

De Calamentho.

Aquæ matricariæ.

Eupatorii.

Artemisiæ.

DE MEDICAMENTIS

concoquentibus bilem atram.

In capite.

Syr. fum. terræ.

De Epithimo.

Lupulorum.

Aq. fumiterræ.

Lupulorum.

In splene.

Syr. de fumo terræ.

Fumariæ.

Ceterach.

De Epithimo.

Aq. Scolopendriæ.

Epithimi.

Fum. terr.

In corde.

Syr. de pomis.

Buglossæ.

Aqua

Aquæ melissæ.

Buglossæ.

Viperinæ.

Borraginis.

Nota me posuisse aquas; tu si ex eisdem simplicibus decocta volueris præscribere, ad libitum poteris administrare; solum aduertas velim, aquas stillantias (si suo tempore distillatæ fuerint) habere & conseruare toto anni tempore suam propriam & omnimodam virtutem & facultatem, quæ non semper reperitur in plantis, vt desideras.

CORRIGENTIA MEDICAMENTA purgantia.

A Garicum corrigimus cum zinzibere & oximellite.

Sena corrigitur cum iure gallinæ.

Rhabard. corrigitur cum spica nardi addito ʒ. j. spicæ ad ʒ. j. Rhab.

Turbith corrigitur cum zinzibere in eadem quantitate ʒ. j. ad ʒ. j.

Scammonium corrigitur coquendo ipsum cum malo coroneo, & fit diagridium,

dium, similiter corrigitur cum mastiche, cum thure, vel cum pulegio, & ideo ad emendandas noxas quæ in ventriculo ex Scammoneo fiunt, miscetur cum decocto mirobolanorum vel aqua Citoniorum, cuius dosis est ℥. j. ss.

Mirobolani non habent correctiuum dempta correctione, quæ per torrefactionem fit, quia clementiora sunt, in qua torrefactione deperditur vis purgandi.

Tamarindi similiter carent correctione: nam tamarindorum pulpa datur ad ardorem in quantitate ℥. j. & totidem cassiæ fistulæ cum ℥. j. Rhab. & aliquando citra correctionem.

Polipodium corrigitur cum zinzibere, cinnamomo, vel semine anisi.

Epithimum corrigitur additis aliquot granis piperis vel salis gemmæ.

Elleborus corrigitur cum seminibus calidis vel odoratis, vt aniso, dauco, fœniculo, vel petroselino.

Hæc omnia veniunt corrigenda, præcipuè cum administrantur per se; nam cum præscribuntur cum aliis confectio-
nibus.

nibus tunc temporis parum refert (et si
semper prodest) absque correctione
propinare. De clysteribus iam tempus
est aliqua pertractare.

DE CLYS TER I BV S.

Clyster, est medicamentum per se-
dem iniectum ad soluenda potissimum
intestinatorum excrementa, quamquam
ob alios vsus quotidie clysteres à medi-
cis describuntur.

Clyster duplex est, alter ex parte eua-
cuans, nempe ex intestinis, alter ex toto
corpore. Prioris meminit Gal. 4. *Aph.*
comm. 2. ubi post medicamenta purgan-
tia posuit errhina & apophlegmatif-
mata tamquam ex parte euacuantia, par-
ticulariter cum ex cerebro humorem
educant, & addit statim clysterem esse
ex genere eodem, ac si dixisset, medica-
mentum est clyster euacuans ex parte,
scilicet ex intestinis ut supra dictum est.
Posterioris meminit Gal. *lib. de salubri*
dieta com. 15. quo loco ut in angina hu-
morem facilius educeret, clysteris pur-
gan

gantis meminit, tum etiam & 2. *de comp. sec. locos cap. 10.* ex Archigenis sententia, clysterem euacuantem ex toto corpore validum propinabat, ut ea quæ in infima hepatis parte erant, euacuaret. Id etiam nobis demonstrat quotidiana experientia in curanda apoplexia & veterna affectione, tum etiam & in quotidianis febribus; quandoque medicamēta purgantia, ut est Agaricus, Diacatolicon & benedicta, per sedem iniiciuntur.

Est etiam vsus clysterum utilis ad discutiendos flatus, & quod magis est, ad nutritionem aliquam faciendam.

Sed quoniam quæ dicta sunt difficilia apparent, id amplius à nobis explicandum erit, nimirum qua ratione, ea quæ per sedem iniiciuntur possint nutritionem efficere, tum etiam & ex cerebro & ex toto corpore facilius euacuare, cum certissimum sit non posse ea quæ per sedem iniecta sunt, secundum substantiam ad ventriculum pervenire. Sed observandum est primo crassa intestina eadem tunica prædita esse ac tenuia, quemadmodum & ven-

triculum; vnde eandem vim habet concoquendi, etsi minorem ob excrementorum prouentum.

Secundo obseruandum est posse intestina crassa longiori tempore alimentum concoquere, quamuis nutritio insignis nequaquam fiat ex hac coctione; vnde similiter medicamenta possunt à calore intestinorum reduci in actum, & licet illorum substantia non perueniat ad ventriculum, neque ad aliam partem, potest tamen vis & facultas medicamenti ad longinquas partes peruenire. Tercio obseruandum est non esse in magna quantitate iniicienda per sedem ea quæ in animo est vt diutius detineantur: nam intestina pondere grauata subito ad ea expellenda mouentur, & ideo recta cum ratione medici facere solent in administrandis clysteribus nutriendis ea in exigua mole præscribere, vt hac ratione diutius immorentur in intestinis. In aliis verò clysteribus administrandis contraria ratione fit, exhibentur enim in magna mole medicamenta, vt intestina grauata statim ad expell

pellendum moueantur, siue purgans clyster sit, siue lenitiuum, à quo scilicet aliud solum aduehitur, & ex his manifestum fiet, quare purgatiua medicamenta per sedem iniecta breuiori tempore euacuationem efficiant, quàm exhibita per os, quamuis minor sit calor in intestinis quàm in ventriculo.

Pro cuius explicatione obseruandum est, purgantia medicamenta duplicem habere substantiam, alteram à qualitate manifesta, alteram à tota substantia; à qualitate manifesta plus iusto sunt acria, quia sunt plus iusto calida, & ita irritando secundum hanc partem solent aliquando euacuationem efficere, ut accidit in clysteribus, in quibus purgantia à qualitate manifesta sunt admixta, nam partem irritat vis prius in actum reducta quàm illa quæ est totius substantiæ, cum sint grauata pondere intestina, quæ irritata subito euacuationem efficiant: ita tamen ut euacuatio ex toto fiat corpore & ex cerebro; quæ quidem in potionibus & pilulis fieri non possunt, nam quauis pars quæ irritat, prius in actum
redu

reducatur, cum non sit mole grauatus ventriculus ipse, & qualitate medicamenti, non mouetur ad expulsionem, & ideo progrediente vltius actione caloris, pars purgatiua in actum reducitur, ita vt non irritando, sed attrahendo à similitudine totius substantiæ educeretur. Ex quibus manifestum fit, quare si verbi gratia ℥. ij. Diacatol. per sedem iniiciantur medio clystere, & totidem per os, citius & promptius clystere euacuatio fier.

Est præterea alius vsus in clysteribus non contemnendus, quando ad cohibendam aluum, & sedandas deiectiones in diarrhæa & dysenteria vtiliter commendantur: tum etiam vt somnus concilietur, quod reuera facit peruenire facultatem medicamentorum ad cerebrum, etsi per sedem injecta sint.

Valent etiam clysteres aliquando ad tergendam vlcera intestinorum & ad eadem agglutinanda, qui omnes vsus nec parui sunt, nec exigui momenti, imo maximæ considerationis, & ideo singulorum formam instituo.

Cly

Clyster nutriens.

℞. Iuris carniū arietis, & gallinæ quadram vnam, olei ros. ℥. j. vitellorum ouorum nu. ij. misce pro enemate; adhiberi debet tepidè, vt diutius detineatur.

Clyster lenitiuus.

℞. aquæ fontanæ quadram j. ℔. olei communis & mellis añ. lib. ℔. salis gemmæ ℥. ij. coquantur ad ignem ita vt rectè misceantur, & calidus administretur.

Alius ad idem.

℞. herbarum emollientium, s. maluarum, acantiij, mercurialis, violarum, betheæ, & furfuris ℔. j. olei ros. & viol. añ. ℥. iij. conf. Bened. & hieræ. s. Gal. añ. ℥. j. salis gemmæ ℥. j. misce & fiat enema.

Ad

*Ad pituitam & flatum discu-
tiendos clyster.*

℞. decocti rutæ, sem. lini, radicum
althææ, fl. Chamo. lib. ij. ꝑ. olei rutacei.
℥. ij. olei viol. ℥. j. Agarici. ℥. ij. misce pro
enemate.

Hic clyster calidus administretur, ut
diutius si fieri possit detineatur.

*Clyster irritans ex capite & aliis
partibus humores
educens.*

℞. Centaurij minoris m. j. furfuris,
sem. fæniculi, & lini añ. p. j. coquantur
omnia in sufficiente quantitate aquæ,
donec tertia pars absumatur, cola & de
colatura sume lib. ij. hieræ logodion.
℥. j. benedictæ. ℥. ꝑ. olei rutacei. ℥. iij.
misce pro enemate.

Calidus administretur, & si vis ma-
gis irritationem efficere adde trochisc.
Alend.

Aland. 3. ij. valent potissimùm in apoplexia.

Clyster discutiens flatum potissimùm ex utero.

℞. iuris intestinorum arietis quadras iij. florum melliloti & sem. lini añ. p. j. coquantur cum prædicto iure, de quo accipe quadras ij. olei communis 3. iij. misce pro enemate.

Clyster ad contemperandam aliquando acrimoniam in febribus.

℞. hordei integri p. j. coquatur in quadris quatuor aquæ usque ad consumptionem medietatis: cola & accipe quadram j. β. sacchari albi 3. ij. misce pro enemate, & tepidè administretur.

Alter ad idem.

℞. lactis caprarum quadras ij. rectè bulliat ad ignem, cola & tepidè administretur.

Clyster

*Clyster ad abstergenda ulcera
intestinorum.*

℥. hordei integri p. i. coquatur in
quadris iiii. aquæ ad consumptionem
tertiæ partis, cola & colaturæ adde mel-
lis albi coclearia iiii. vel Rhodomellis
in eadem quantitate, misce pro enema-
te, & calidus administretur, sicque dici-
tur lauatiuus.

Clyster contra fluxum.

℥. lactis caprini lib. iiii. coquatur ad
ignem, & postquam ebulliuerit fac cha-
lybeare, vel extinguat in ipso lapides
ignitæ, & tepidè administretur; & si in
animo est magis cohibere fluxum, adde
amiliij ℥. β. & si forsan in animo est vti
extremis remediis, cum lacte misceatur
℥. j. phylonij maioris aut Persici.

Ad idem aliud.

℥. hordei integri, ros. siccarum, plan-
taginis

ginis, sanguinariæ, bursæ pastoris, caudæ equinæ añ. p. i. coquantur omnia in aqua ad consump. tertiæ partis, cola & adde vitellum oui, olei ros. ʒ. amilij tosti. ʒ. ʒ. misce pro enemate.

*Ad idem & conciliandum
somnum.*

℥. hordei integri, ros. siccarum & fol. plantag. añ. p. i. capitum papaue-
ris contusorum in sem. num. ij. coquan-
tur omnia in debita quantitate aquæ,
cola & de colatura accipe lib. i. amilij.
ʒ. j. vitel. ouorum num. i. olei ros. ʒ. ij.
misce pro enemate, & calidus admini-
stretur.

Clyster ad conglutinanda ulcera.

℥. iuris pedum hirci quadr. ij. amilij.
ʒ. j. misce pro enemate, & tepidè admi-
nistretur. Ad hunc etiam vsum valet lac
chalybeatum, quòd crustam inducat su-
pra vlcus.

DE

DE SUPPOSITORIIS.

Cogimur & aliquando in forma solida per rectum intestinum medicamenta intromittere, tum quia clysteres minus recipiantur à quibusdam, tum etiam & quod magno cum periculo administrantur iis qui hernia aliqua laborant, & potissimum intestinali dicta, & proinde hanc formam tribuo.

Suppositorium ad subeundam aluum.

℞. pul. hieræ picræ ʒ. ij. salis gemmæ ʒ. j. mellis q. s. misce & fiant duo suppositoria filo appensa.

Ad idem aliud.

℞. conf. hieræ picræ ʒ. ij. benedictæ ʒ. β. salis gemmæ ʒ. j. mellis q. s. misce & f. duo suppositoria, vt supra.

Aliud multum irritans.

℞. specierum hieræ logod. ʒ. ij. salis
gemmæ ʒ. j. mellis q. s. misce & f. duo
suppositoria filo appensa.

Ad idem aliud.

℞. interioris colocintidos gal. ʒ. ij.
salis, &c.

*Suppositorium ad sedandum dolorem
fluxumq; cohibend. in intestinis.*

℞. phylonij maioris ʒ. ij. opij grana
m. mellis q. s. misce & fiant duo sup-
positoria filo appensa.

DE VOMITORIIIS.

Et si vomitus non sit procurandus ni-
si vigeat necessitas, cum exhibere ut de-
uomat non vomenti periculum sit, nec
citra rationem fit vomitus per superio-
rem ventrem, in quo valde exquisitus
sensus

sensus reperitur ob nervos recurrentes dictos, qui sanè insignes sunt; nihilominus tamen aliquando cogimur medicamenta vomitum prouocantia præscribere, nec solum ad id efficiendum mitiora exhiberi debent, & quæ tergendò, irritando & impellendo ventriculum præstent, verùm etiam in hoc casu via fuit antiquitus, medicamentis purgantibus ad vomitum accommodatis uti, quæ inter purgantia vehementissima sunt, ut est Elleborus, qui inter omnia quæ per vomitum nata sunt humorem educere maximè commendatur. Quod autem purgationes antiquis in usu essent testatur Hipp. 4. *Aph. sent. 6. 7. & 8.* & alibi, in quibus sententiis præcepta ab Hipp. proponuntur ad dictas purgationes præscribendas.

Sunt etiam ex usu vomitus in quibusdam morbis curandis, ut fit potissimum in cholera morbo curando, & in tertiana notha, & similiter in aliis morbis in quibus os ventriculi affici solet aliquo humore plus iusto molestante: debet tamen semper vomitus fieri exhibi-

to medicamento vomitorio in magna quantitate, ita vt quantitas potionis sint quadræ iiij. vel amplius: tutius est à cibo vomitum excitare assumpto, quam non, idque fit potissimum in tertianis curandis.

Cæterum consueuerat Hipp. corpora præparare, vt vomitoria medicamenta præscriberet, idque quiete, & aliis, quibus ventriculus humidus reddebatur, deinde corpora humida reddebat & mitiora medicamenta exhibebat per vomitum. Huc accedit consuetudo antiqua in vomendo: erat autem vomitus maximè in vsu, quod contra fit hac nostra tempestate; vnde maiori cum periculo solent purgationes per vomitum fieri, & si aliquândo accidat vt per vomitum pharmaco exhibito humores educantur maxima anxietate, & non exiguo labore vexari solent ægrotantes, nec tamen medicus generosus debet cohibentia vomitū præscribere, ne scilicet mortis sit auctor, sed potius medicamenta vomitoria præscribere debet, quibus frui debet digitis impositis intra gulam,
vel

vel pennis ex gallina madefactis oleo, vt ex his nauseabundi facti ægrotantes vomitus efficiatur, neque incommodum est aliquod medicamētum vomitorium commune præscribere, vt qui in ventriculo sunt humores melius educantur.

Est autem vomitus humoris innatan-
tis eductio, siue euacuatio. Nausea verò ex humore impacto fit in orificio ven-
triculi superiori.

Vomitorium commune.

℞. hordei integri p. j. sem. fæniculi
p. β. seminis Raphani quartam partem
pugilli, coquantur omnia in lb. xij.
aquæ ad cōsumptionem medietatis, co-
la & colaturæ adde sacchari albi ℥. ij.
aceti optimi cochlearia ij. vel iij. misce
& fiat vomitorium.

Vomitorium purgans.

℞. Ellebori nigri & Agarici ℥. j. aquæ
mellis ℥. iij. misce & fiat potio, etsi non
sit tuta, sed si administretur sit tepida.

DE SUPERPURATIONIBUS.

Accidit aliquando ut immodica purgatio ex medicamento assumpto contingat, quod potissimum cognoscitur ex defectu virtutis, quod vires languescant, & pulsus debiles fiant, & aliquando etiam citra immodicam purgationem maxima anxietate & dolore aegrotantes crucientur in orificio ventriculi & portione potionis ibi contenta, vel ex humore plus iusto irritante quem attrahit medicamentum sua facultate, huic semper occurrendum est adhibito amilo quantitate ℥. j. decocto in aqua, & moderate frigida adhibita.

Ad immodicam verò purgationem conducunt crurum frictiones, pedum potissimum & manuum, tum etiam & ossam panis biscocti in optimo vino mactatam propinare, quod si ulterius progrediatur immodica purgatio, supra ventriculum appones interiora panis cum vino optimo obruta & ad ignem parum.

parum cocta, & admiscebis ʒ. j. vel ʒ. ij. cinnamomi, & si multum vrgeat euacuatio ʒ. j. mastichis. In hoc casu conducunt clysteres ex lacte cocto & aliquando etiam chalybeato, cui amilum aliquando vtiliter permiscetur, conducet etiam aquam chalybeare. Sint alimenta adstringentia, & boni succi, conficiantur iuscula ex gallina & ariete, decoquetis cum his frustum mali citonei vel pyri cum cortice, cum quo iure panem cōficiēs tritum & prius coctum, vulgo [pan rallado] admiscendo semper parum cinnamomi, quæ omnia non citra rationem à nobis obseruantur, cum soleat per multos dies purgatio fieri.

Quod si contra ex medicamento assumpto exigua vel nulla euacuatio succedat, quod fieri solet eodem die, nihil immouere oportet præter appositionem pannorum calidorum ad ventrem, altero verò die clyster communis præscribendus est, quod si id non suppetet, iterum erit repetendus clyster medicatus cum hiera & benedicta.

De Errhinis medicamentis.

Aliquando post vniuersales euacuationes & particulares per purgantia medicamenta factas, solent medici vtiliter humorem ex eadem parte educere, quod fit potissimum per errhina medicamenta & masticatoria, cum quibus ex cerebro particulares humores educuntur: dicitur autem errhinum medicamentum euacuans per nares, & hoc duplex est, humidum scilicet & siccum, humidum manu imponitur tepidè manè & ieiuno corpore, idque tribus vel quatuor vicibus, ita vt pro vnaquaque vice post attractum medicamentum nares optimè repurgentur ab omni humore & excremento. Siccum errhinum in puluerem reducitur & per pennam intra nares exufflantur, quamuis soleant aliquando cum aliquo liquore vel citra liquorem dicta errhina imponere, ita vt vincto filo naribus imponantur.

Sicca

Sicca errhina.

Piper, castoreum, euphorbium, elleborus albus, & niger, Agaricus, ex quibus pulvis componitur æquis partibus in hac forma.

℞. piperis, castorei, ellebori añ. 3. j. pulueriscentur & misceantur.

Ad idem aliud.

℞. piperis & ellebori añ. 3. j. succi betæ & maioranæ depurat. añ. q. s. misce & ad ignem misceantur in forma liquida.

Errhina humida.

Parantur hæc errhina ex succo brassicæ, cæparum, absinthij, radicis nigellæ, marrubij, betæ, maioranæ, qui duo succi posteriores, magis apud nos sunt in usu. Errhinum humidum fit hoc modo.

℞. succi betæ depurati 3. s.

Agarici 3. s. mellis 3. iij. misce.

G s

Est tamen aduertendum quod maiorana non ita reperitur vt beta, & ita magis tutum erit ex succo betæ errhinum præscribere, cui aliquando miscebis succum ieros depuratum.

Horum est vsus in longis & diuturnis morbis capitis, vt sunt dolores diuturni, & alia, vt in morbo comitiali, ad reuellendam distillationem impetum facientem in cavitatem pectoris & ventriculi, & fauces, & aliam quamcumque partem. Commendantur etiam ad oculorum diuturnas affectiones, vt sunt ophthalmiæ, suffusiones, vngues, & aliæ huiusmodi, valent etiam ad difficultatem odoratus, ad neruorum obstructiones, & aliquando ad tergendâ vlcera quæ fieri solent in morbo gallico circa colatoria, in quo affectu fieri solet erosio in osse ipsius nasi, ita vt os concidat.

DE MASTICATORIIS.

Ad eos vsus ad quos errhina præscribuntur à medicis, masticatoria apophlegmatismata dicta præscribi solent, nomen

Medicina.

155

men autem sumpserunt ab euentu, quod scilicet in ore detenta & ipsa mastican- do per os humores soleant educere & euacuare, potissimum ex cerebro faci- lius & ventriculo & aliis vicinis parti- bus. Sunt autem hæc medicamenta va- ria, ex quibus alia mitiora, alia fortiora dicuntur.

Mitiora sunt.

Hyssopus, thymus, nux moscata, ori- ganum & pulegium.

Valentiora sunt.

Serapium, pyretrum, piper, semen sta- phisagrios, mastiches, zinziber, & radix achori. Hæc aliquando per se sola deti- nentur in ore, & veluti commanducan- tur dentibusque confringuntur, ali- quando ex his solent medici cum cera orbiculos parare in modū lupinorum, vt hac ratione in ore medicamenta de- tenta suum efficiant opus. Est autem orbiculorum descriptio sequens.

℞. medullæ seminis staphisagrios

G 6.

℞. mastichis, pyretri, piperis, & radicis acorij añ. ʒ. ij. ceræ albæ q. s. misce & fiant orbiculi in modum lupinorum: quod si forsan medicamenta non reperiuntur ex aliis simplicibus in eadem quantitate orbiculos confice. Commendantur autem masticatoria in apoplexia, & paralyfi curandis, & potissimum nux ipsa muscata, cuius frustum statim in ore detinendum esse præcipiunt medici in paralyfi curanda. Atque hæc dicta sint de masticatoriis, quibus pituitam ex cerebro per palatum euacuamus.

DE SUDORIFICIS.

Solent medici aliquando curationem moliri per sudorem applicatis ad id mouentibus sudorem, idque dupliciter, vel in forma humida vel sicca, & sic vulgò dici solet (stuphas en seco, o sudores con baño) quod potissimum fit in morbis frigidis curandis, vel per suffitum morbum curare aggrediantur, vel per hydrargirij vnguentum, vt in morbo Gallico.

Parantur

Parantur sudorifica medicamenta in forma humida quibusdam facculis longitudine duorum palmorum & latitudine vnus palmi, qui facculi adimplentur ex medicamentis sudorificis, deinde ad ignem in aqua apponuntur, donec bulliant vehementer. Hos facculos sic calentes, prope caput vnus apponitur in summitate; alter, vero prope pedes, alter curuatis cruribus in spatio vacuo infra genua, similiter brachiis, in vnoquoque spatio vnus est apponendus, deinde rectè cooperiatur æger, & iaceat supina forma. Sunt autem medicamenta quæ intra facculos ponuntur sequentia.

℞. saluæ montanæ, roris marini coronarij, maioranæ, fol. lauri, basiliconis syluest. chamom. rutæ, origani, menthæ, & pulegij, añ. p. xij. piperis ℥. j. cario-phyl. ʒ. j. mirrhæ ʒ. β. ligni aloës & cinnamomi añ. ʒ. j. ros. siccarum p. v. contundantur omnia, & ex his in dicta forma facculi impleantur.

Sudorifica in forma sicca parantur ex Cinnabrico (vulgo sanies drachonis vel
vermel

vermellon) in hac forma præcipiunt ut æger nudus in cubiculo plus iusto calido stet, ipsumque rectissimè cooperiendum esse præcipiunt cum stet rectus, ita tamen ut caput & os nequaquam cooperiantur: solet enim vapor Cinnabrij infestissimus esse thoraci & nervis, in hac ergo forma detento ægro supra prunas ignitas apponant Cinnabrij iij. 3. j. ex quo vapor quidam calidissimus & vehementissimus eleuari solet, qui ob suam vehementiam & caliditatem sudorem excitat quamplurimum. Sunt autem qui hoc medicamento non utuntur ob illius feruescentiam (& meritò) nisi in morbo Gallico admodum pertinaci, & aliis similibus.

Præsidia verò pro lue venerea curanda efficacissima esse inunctiones ex hydrargyro plerumque experti fuimus, ad eò ut quos diæta ex radice Chinæ & Guaiaco & salsa perrilla curare non potuerat, hoc postea adhibito remedio, ex toto reualuerint, quare vnguentum sit.

℞. axungia suillæ sine sale 3. viij. Argenti

genti viui defœcati ℥.iiij. cineris sarmen-
torum lythargirij, & cerusæ añ. ℥.j. ma-
stiches ℥.ß. olei laurini ℥.ij. ther. magnæ
℥.ß. agitetur primo loco argentum vi-
uum cum axungia, post cuius extinctio-
nem reliqua addantur, & fiat vnguen-
tum.

*De medicamentis digerentibus eua-
cuantibus.*

Sunt autem medicamenta digerentia
euacuantia, quibus medici potissimum
vtuntur ad humores digerendos, qui
sunt in tumoribus præter naturam &
etiam in partibus dolore affectis: valent
similia ad discutiendos flatus, tum etiam
& ad calfaciendas partes refrigeratas, &
roborandas imbecilles ex frigida intem-
perie. Hæc digerentia vel mitiora sunt,
vel vehementiora.

Mitiora sunt oleum Chamomelli-
num, rosaceum, amygd. dul. aneth. & de
nucibus.

Valentiora sunt oleum iuniperi, ruta-
ceum,

ceum, absinthij, amygd. amararum,
oleum laurinum, oleum nardinum,
oleum vulpinum, & oleum scorpio-
num.

His utimur aliquando solis vngen-
do partes cum aliquo ex dictis oleis, &
ex alto superinfundendo supra partem,
aliquando verò vnguenta ex his confi-
ciuntur cum cera & aliqua axungia hu-
meſtante habente vim digerendi.

In forma liquida ſit præſcribitur.

℥.olei chamom.& anethini añ. ℥.ij.
miſce.

In modum vnguenti talis eſt
forma.

℥.olei vulpini & ſcorp. añ.℥.j.olei
laur.℥.ij.axungia gallinae ℥.iiij. axungia
vulturis ℥.ij. ceræ parum, miſce & fiat
vnguentum.

*De Medicamentis euacuantibus
per urinam.*

Per urinam potiffimùm humores
crudos & craſſos ſolent etiam medica-
menta aliqua euacuare, vbi per coſtio-
nem à natura mouentur, nam tunc na-
tura

turæ motum seruamus, quæ solet magna ex parte hos humores per urinam mouere, rarò verò per aluum, iuxta Gal. *sentent. 3. prog. com. 23.* Hæc autem medicamenta quàm plurima esse solent, potissimùm sequentia.

Radices pastinacæ, folia raphani, ciceres nigri & albi, therebintina abietis cum saccharo confecta in modum pilularum, radices asparagi, rad. fæniculi. semen petroselini, dauci & anisij. His utimur etiam ad tollendas obstructions, nam diuretica aperientia sunt, verùm in tertianis nothis utimur ubi longæ fuerint, & potissimùm quando diuretica non sunt multùm calida, in quo euentu optimum erit si vnà cum his semina cucurbitæ coquantur contusa, mundata tamen à cortice; nam semen cucurbitæ, quamuis frigidum sit, tenuium est partium & aliqua ratione diureticum, erit autem descriptionis forma sequens.

℞. sem. cucurbitæ contusi ℥. β. ciceris cum toto, borraginis, & cap. veneris añ. m. i. corticum rad. Aspar. ℥. ij. cicerum nigrorum num. xv. coquantur omnia

omnia in sufficiente quantitate aquæ ad
consumptionem 3. partis, cola & de co-
latura accipe lb. ij. syr. cap. veneris, & de
v. rad. añ. 3. iij. misce, & si manus dictam
coctionem cum saccharo poteris exhi-
bere.

*De medicamentis mouentibus
menses.*

Mouentia menses eadem sunt ac
diuretica, præcipuè obtinent principa-
tum in his cap. veneris, cort. rad. sabinae,
arthemisia & limatura chalybis vel sco-
ria ferri cum aceto præparata, dummo-
dò prius in tenuissimum pollinem re-
ducta fuerint, hæc post vniuersalem
euacuationem totius corporis & ipsius
ventriculi utiliter commendantur.

Formantur etiam ex limatura ipsa pi-
lula vulgo dicta (de la ferria) vel de ri-
bes, quæ conficiuntur cum mitridatica
confectione & antidoto emagogo añ.
q. s. vt in formam massæ pilularum li-
matura chalybis deducatur. Sunt sem-
per in exigua quantitate conficiendæ

ad magnitudinem v. granorum piperis.

Præparatur etiam in forma confectio-
nis aliquando permiscendo pulue-
rem chalybis in quantitate ℥. ij. cum
melle optimo & despumato, cuius quā-
titas sunt cochlearia duo aut iij. in pilu-
rum vero forma, num. vij. vel viij. vno-
quoque die mane ieiuno stomacho.

Est tamen maximè obsetuandum ut
per spatium vnius horæ continuò mu-
eres moueantur sensim deambulando.
Pilulæ in schedula ita describuntur.

℞. massæ pilul. ex limatura chaly-
bis. ℥. β.

Confectio sic describitur.

℞. limaturæ chalybis præp. ℥. ij.
cinnamomi ℥. ij. mellis despumati ℥. vij.
misce & fiat confectio.

De medicamentis pectoralibus.

Sunt quædam medicamenta in vsu
apud medicos ad humorem in cavitatem
toracis educendum, quæ aliqua ratio-
ne euacuante dici possunt, quæ vulgo
dicuntur (lamedores) à lambendo, sen-
simque

simque assumuntur : sunt autem ex his
quædam mitiora, alia verò vehementiora,
mitiora sunt confer. viol. syr. viol. syr.
liq. confer. cap. veneris. syr. cap. veneris
& oxim. Potentiora sunt syr. de hyssopo
de prasio, oxim. schil. quæ semper in ex
gua quâtitate præscribi debent ob illius
vehementiam & acerrimum saporem.

Sunt & pectoralia Elect. dragachani
frigidi, succus liquiritiæ, diaireos, cor
fectum ex radice lilij albi, quod est po
tentissimum pectorale.

Sunt etiam & pectoralia, amylun
penidiæ, sacch. cand. simplex & vi
laceum, & cap. ven. radix liquiritiæ, hy
sopus, iuiubæ, ficus pinguis, dactil
quales apportantur ex Argel.

*Syrupi pectorales præscribuntur in
hac forma.*

℞. syr. cap. ven. & viol. an. ℥. ij. misc.

Alius fortior.

℞. syr. liq. ℥. ij. oxim. s. ℥. iiij. misc.

℞. syr. liq. & cap. ven. an. ℥. iiij. oxim.
s. ℥. ij. misc.

Ala

Alius fortior.

℞. syr. liq. & oxim. s. añ. ℥. iiij. oxim.
chil. ℥. j. misce.

Forma decoctionis pectoralis.

℞. liq. rasæ & contusæ ℥. ss. cap. ven.
hisopi añ. m. j. iuiubarum nu. iiij. co-
quantur omnia in sufficienti quantita-
te aquæ ad consumptionem tertiæ par-
tis; cola & pro usu serua.

Fieri etiam solent ad expurgandum
pectus alia medicamenta in forma di-
versa, quæ vulgò dicuntur alosas, con-
iunguntur autem ex dictis pectoralibus
herbibus, & similiter ex variis generibus,
inde quod inter pectoralia etiam nu-
merantur ad expurgandum humorem
contentum in pectore, vt sunt loch de
sani, & caulium & pulmone vulpis. Est
item alosæ descriptio.

℞. loch sani & experti ℥. j. penidia-
m & sacchari candi añ. ℥. ss. pul. liqui-
tæ & gummi dragach. añ. ℥. j. ss. syr.
quiritiæ vel viol. vel cap. ven. vel oxim.
f. ℥.

f. 3. iij. amili ad inspissandum : misce & colli
fiat aloffa.

Diacodion cum melle similiter commo-
mendatur ad expurgandum humores
contētum in pectore, & vius etiam cum
melle & sapa. Huius autem non licet
magnam quantitatem propinare, quod
fit medicamentum ex capitibus papae
ueris, sufficit vnoquoque die cocleari-
um vnum exhibere noctu hora somni
ni, & cum urgeat necessitas cocleari-
dico tempore interposito. Potissimum
commendatur in distillationibus, quod
rum impetus ad cavitatem pectoris fel-
tur, tum etiam & in quibusdam febr-
bus, quando ex humore aliquo graui-
tas perſentitur in pectore, in pleuritide
tamen numquam hoc vti licet.

Est etiam sulphur album pectora-
medicamentum, verum in phthisi, ad e-
siccanda vlcera, vtiliter commendat
quantitate 3. j. cum melle, admixtu-
cum ouo, vel cum decocto hordei. B-
lum similiter Armenum ad id comme-
datur in eadem quantitate & sim-
modo.

Elect

Electuarium magistrale ad pectus.

℞. pulueris liquiritiæ & dragach.
gummi añ. ʒ. iiij. conf. viol. & cap. ve-
neris añ. ʒ. j. zach. dissol. in aq. cap. ven.
q. s. misce & fiat elect. in tab. ʒ. j. pond.

Ad idem medicamenta exterius applicata.

Solent medici in pleuritide potissi-
mum ad humorē exterius attrahendum,
& vt sensim illum digerāt & attenuent
& aptiorem reddant, vt melius per spu-
rum educatur, medicamenta aliqua ex-
terius applicare supra partem dolore
affectam. Sunt autem hæc potissimum
duo, emplastrum filij Zachariæ & de
melliloto cum discrimine tamen, nam
si crassus sit humor, emplastrum de
melliloto erit in dupla quantitate appo-
nendum, eo quod sit magis digerens; si
verò non sit crassus, æquis portionibus.
Emplastrum etiam puluerisare solent
cum puluere Ircos, addendo parum the-
rebintinæ

rebintinae communis, vt possit emplastrum supra partem detineri: est autem descriptio emplastri sequens.

℞. massæ emplastri filij Zachariæ & de melliloto partes æquales, therebintinae communis parum, malaxentur & extendantur super alutam ad formam quartæ par. folij papyri.

Aliud magis digerens.

℞. massæ emplastri de melliloto ℥.ij. massæ emplastri filij Zachariæ ℥.j. therebintinae communis parum, malaxentur & extendantur supra alutam ad formam quartæ partis folij papyri, puluerisetur cum puluere ireos.

Alia medicamenta topica solent etiam supra partem apponi, vt sunt calfasctoria dicta, quæ vtiliter commendantur in statu & declinatione pleuritidis. Paratur huiusmodi medicamentum ita.

℞. sem. lini, sem. fænugræci, fursuris, chamomillæ, florum meliloti, & cort. rad. althææ añ. p. i. ficum pinguium num. vii. aq. q. s. misce & fiat

potio

potio vsque ad spissitudinem aquæ, cola & intra calfactorium instrumentum iniice, vel in defectu huius intra vesicam bouis, & supra partem dolentem calidum plus iusto detineatur.

De roborantibus post purgationem.

Accidit aliquando vt ventriculus & hepar ab euacuatione imbecillia redantur, tunc medici solent huiusmodi partes roborare aliquo præscripto electuario, vt diarhodonis Abbatis, & diarmargaritonis, & diatrium santalorum. In caussa frigida valent Electuarium arom. ros. ex descript. Gabrielis, Elect. diacuminum, Elect. rosatæ nouellæ, & similia.

Fiunt etiam aliquando Elect. magistralia, quæ ad dictos vsus non parum conducunt, vt in caussa frigida.

℞. pul. arom. ros. descript. Gab. ʒ. iij. confer. melissæ ʒ. iij. sacch. dissoluti in aqua borraginis q. s. misce & fiat electuarium pond. ʒ. ij.

*Aliud ad excitandam venerem &
multum calfaciendum ven-
triculum.*

℞. pul. diacamaronis & arom. ros. ex
descript. Gabrielis, añ. ʒ. ij. conser. me-
lissæ ʒ. iij. sacch. dissol. in aq. melissæ q. s.
misce & fiat Elect. in tab. ʒ. ij. pond.

*Aliud pro hepatis & venarum
obstructionibus.*

℞. pul. rosatæ nouellæ & diarh. Abb.
añ. ʒ. j. cōser. florum chicorij ʒ. iij. sacch.
dissol. in aq. cap. Ven. q. s. misce & fiat
Elect. in tab. ʒ. ij. pond.

In caussa calida.

℞. pulueris diamargar. fr. diarh.
Abb. añ. ʒ. ij. conser. ros. ʒ. iij. sacch. dis-
sol. in aq. ros. q. s. misce & fiat Elect. in
tab ʒ. ij. pond.

De

DE CONDITIS VEL
*conseruis roborantibus post
purgationem.*

Ad eosdem vsus valent condita, vulgo conseruæ, ex his parari solent electuaria opiata & similia ad morbos frigidos & calidos, addendo aliquem puluerem magistralem vnâ cum sufficienti quantitate aquæ, vt fiat in modum conditi.

Conseruæ ad morbos calidos sunt.

Conserua rosarum, violarum, borraginis, buglossæ, nenupharis, quæ omnes dictæ ex floribus parantur, conserua acetosæ quæ paratur ex foliis.

Conseruæ ad morbos frigidos.

Electuarium liquidum arom. ros. ex descriptione Gabrielis, conser. florum chicorij, florum fum. florum rorismarini, conser. cap. veneris, conser. raphani

gallicani omnium calidissima & corti-
ces citri saccharo conditæ.

*Ex frigidis paratur conditum
sequens.*

℞. conser. ros. buglossæ & borragi-
nis añ. ʒ. j. β. pul. diamargaritonis f. ʒ. j.
sacch. q. s. misce & fiat conditum.

Ex calidis pro melancholicis.

℞. conser. borraginis & mellissæ añ.
ʒ. j. β. conser. flor. fumiterræ ʒ. j. corti-
cum citri sacch. conditi & minutim in-
cisi ʒ. vj. pul. arom. ros. descrip. Gabrie-
lis ʒ. iiij. sacch. q. s. misce & fiat condi-
tum in modum opiata.

Ad idem pro diuitibus.

℞. Elect. liquidi arom. ros. Gab. ʒ. iiij.
pulueris diacamaronis ʒ. j. syr. ex cor-
ticibus citri q. s. misce & fiat conditum.

Condita sumuntur mane prima luce,
quorum quantitas est coclearia duo aut
tria

tria cum aqua melissæ, vel viperinæ, vel borraginis, vel fontanæ, ut erit occasio, vel cum vino albo aqua diluto. Sumuntur post quatuor vel quinque horas à cibo assumpto, quandoque hora vespertina.

Similiter etiam & Electuaria supradicta mane dicto modo sumuntur, sub quantitate ij. tabellarum.

*DE MEDICAMENTIS
flatum discutientibus.*

Discutiunt flatus quæ calida sunt, & tenuium partium, hæc magnos habent usus in opere practico sumpta per os, & iniecta per sedem, & extrinsecus appositæ & supra partem dolentem applicata.

Simplicia discutientia sunt.

Vinum generosum, non multum, nec vaporosum, vinum claretum vel album dictum, semen fœniculi, semen cumini, semen anisi, semen dauci, semē raphani,

camomilla vrgelensis, ruta, & cinnamomum.

Composita discutientia sunt.

Puluis diacimini, rosatae nouellae, arom. ros. gab. elect. eiusdem gab. arom. ros. in forma solida & liquida, diamusci dulcis & vsualis, & confectio de baccis lauri, oleum nardinum, anethinum, de lilio, de absinthio, & denique conf. gent. cord. contr. melancholiam.

*POTIO AD DISCVTIENDOS
flatus potissimum in uteri
affectibus.*

℞. diamusci vsualis vel dulcis (si fuerit diues) & conf. gentilis cord. contra melanch. añ. 3. β. syr. de corticibus citri 3. j. aq. melissae q. s. misce & fiat potio.

Confectio ad discutiendos flatus.

℞. confectionis gent. cord. contra melanch. & diamusci vsualis añ. 3. j. pulueris

pulueris arom. ros. gab. ʒ. iij. conser.
melissæ ʒ. j. fyr. ex cort. citri q.s. misce
& fiat in modum confectionis cordialis.

*Electuarium ad discutiendos
flatus.*

℞. pulueris arom. ros. gab. ʒ. iij. se-
minis fœniculi puluerisati ʒ. ij. conser.
melissæ ʒ. iij. sacch. dissol. in aqua endi-
uiæ q.s. misce & fiat elect. in tab. ʒ. ij.
pondere, sumi poterit quacunque hora
diei, potissimum tamen ante cibum, cum
vino albo diluto.

Clyster ad discutiendos flatus.

℞. semin. fœniculi, anisi, anethi &
semin. lini añ. pug. j. foliorum raphani &
rutæ añ. m. ʒ. florum chamom. parum
coquantur omnia cum duabus partibus
aquæ & vna vini albi, cola & de colatu-
ra accipe lb. j. olei rutæ ʒ. ij. benedictæ
ʒ. j. butyri ʒ. ʒ. salis gemmæ ʒ. j. misce
pro enemate.

Ad idem aliud.

℞. iuris confecti ex intestinis anatis
quadras iiij. seminis lini & fol. parietariae & florum camomillae añ. parum coquantur omnia in dicto iure, cola & de colatura fume quadram vnam & semissem, conf. Benedictae ℥. j. olei rutacei ℥. ij. misce pro enemate.

Aliud in melancholia hypochondriaca.

℞. fol. malvarum m. j. rad. altheae & malvarum añ. ℥. ij. sem. maluae & altheae añ. ℥. ss. prunorum dulcium hibericorum & passularum, enucleatarum añ. nu. xv. sem. anisi ℥. ij. succi herbe mercurialis ℥. j. ss. coquantur omnia s. ar. (excepto succo mercuriali) cum capite arietis animalis in sufficiente quantitate aquae ad consumptionem medietatis, cola & de colatura fume lib. j. & ss. & decocto adde olei violacei & de lilio & de chamo. añ. ℥. ij. & cum his misce suc-

cum

cum mercuriale & diaphæn. \mathfrak{z} .j. & misce pro enemate.

*Vnguentum ad discutiendos
flatus.*

\mathcal{L} .olei nardini, & de absinthio añ. \mathfrak{z} .
iij. pul. arom. ros. Gab. \mathfrak{z} .ij. cinnamomi
 \mathfrak{z} .j. ceræ parum, misce & fiat vnguen-
tum.

Ad idem aliud.

\mathcal{L} .conf. de baccis lauri \mathfrak{z} .iiij. serua in
modum vnguenti.

Syr. ad discutiendos flatus.

Aliquando solent medici vbi syrupi
præscribuntur intenti esse vt flatus dis-
cutiant vna cum aliis scopis, scilicet
in curanda tympanite, & tamen vnà
cum aliis simplicibus, in decoctio-
ne solent adhibere semina anisi & pe-
troselini in quantitate \mathfrak{z} . β . & dein-
de facta decoctione vt aromatisen-
tur in \mathfrak{z} .j. cinnamomi & altera vncia

H §

pulueris arom. ros. Gabrielis.

*De stupefacientibus & somnum
inducentibus.*

Stupefacientia & somnum inducencia medicamenta cautè sunt administranda, potissimùm quando intra corpus deuorata assumuntur, nam si vires languidæ sunt, ex his non parum periclitantur ægrotantes, quæ vero extrinsecus apponuntur vel superfusa applicantur, minoris sunt effectus & periculi, potissimùm vbi admouentur supra partes minus præcipuas, vt Gal. 5. *simpl. cap. 9.* docet. Hæc medicamenta quædam sunt simplicia & quædam composita, & omnia vel fortiora, vel mitiora. Simplicia fortiora, vel vt melius dicā, vehemētiora sunt opium, meconium, semen papaueris nigri, cortices radices mandragoræ (quorum vsus omnino est contemnendus, propter ingentem frigiditatem) semen papaueris albi cuius vsus tutus est.

Simplicia mitiora sunt, succus lactucæ,

lactucæ, succus papaveris, succus portulacæ & succus cicutæ.

Composita vehementiora sunt, Phylionis antidotus, Athanasia, Diacodion cum sapa, confectio melissæ, oleum radicis mandragoræ, oleum papaveris, unguentum Populeonis addito opio, decoctum corticum radicis mandragoræ.

Composita mitiora sunt. syr. viol. conser. florum nenuph. oleum rosaceum, syr. papaveris, si debita ratione efficiatur, conserua violarum.

Potio ad conciliandum somnum.

℞. emulsionis ℥. j. sem. papaveris albi in aqua fœniculi extractæ, cuius aquæ sint ℥. ij. syr. papaveris albi ℥. j. conf. Hyacinthorum aut gent. cord. contr. mel. ℥. ij. aquæ lactucæ q. s. misce & fiat potio.

Ad idem coctio.

℞. capitum papaveris albi cum semine contusorum num. xj. hyoschiamini & fol. lactucæ añ. m. j. chamo. vrgelen.

H

p.ij. coquantur omnia in sufficienti
quantitate ad consumptionem medie-
tatis, & pro usu serua ad lauandum ca-
put.

Ad idem potio.

℞. Phyloni maioris ℥.j. syr. buglossæ
℥.j. aq. lactucæ ℥.ij. misce & fiat potio.

Vnguentum ad sedandum

dolorem.

℞. olei violarum & papaueris añ. ℥.
℞. opij. grana vj. olei chamo. ℥.j. ceræ pa-
rum, misce & fiat vnguentum.

De roborantibus cerebrum.

Medicamenta roborantia cerebrum
& potissimum bene olentia, quæ ali-
quando deuorata usum præstare solent,
cum ex ventriculo in cerebrum vapo-
res eleuantur. Aliquando etiam mani-
bus admota permagnos vsus solent præ-
stare, tum etiam supra caput ad usum
eucuphæ.

Sim

Simplicia roborantia cerebrum.

Melissa, salvia, radix galangæ, flos an-
thos, id est, rosis marini coronarij, hæc
dicta administrari solent in decoctis vel
aqua ex his distillatis, lignum aloës,
cinnamomum, muscus, ambar, labda-
num, rosæ siccæ, & rubræ, rosmarinum,
salvia, gith, maiorana, gariophyli, quæ
omnia in suffumigiis naribus ad odorem
gratum comparandum in formam pomi
administrari debent, coriandrum præpa-
ratum, cortices capitum papaveris albi
rosæ, rosæ siccæ, sandaraca arabum, id
est, radix iuniperi arboris, sal tostum quæ
omnia exterius applicari solent in pul-
verem redacta ad formam cucuphæ.

Composita sunt.

Conserua melissæ, syr. ex corticibus
Citri, pulueris arom. ros. Gab. in forma
solida & liquida, conserua florum an-
thos, diagalanga, diamusculus dulcis, &
usualis quæ omnia in modum Electua-

rij

rij, vel in modum cōfectionis cordialis,
vel in puluerem debita ratione solent
administrari sumpta cum melle, vino, &
decocto melissæ.

Syr. ad roborandum caput.

℞. saluæ pug. β. melissæ p. j. borrag.
fæniculi recentis & cap. veneris añ. m.
β. corticum citri. ʒ. ij. coquantur omnia
in sufficienti quantitate aquæ ad con-
sumptionem ʒ. par. cola & de colatura
sume lb. ij. syr. ex corticibus citri, & cap.
ven. añ. ʒ. iij. syr. borrag. ʒ. iij. misce &
aromatizetur cum ʒ. j. pulueris rad. ga-
langæ & altera pulueris arom. ros. Gab.

Ad idem pomum.

℞. saluæ, florum anthos, ligni aloës,
cinnamomi, & ros. rubearum añ. ʒ. j. pul-
ueris entur cum musci & ambre añ. gra-
nis iij. labdani depurati ʒ. β. succi me-
lissæ vel maioranæ q. s. misce & fiant
duo poma.

Cucur

*Cucufa ad roborandum cerebrum cor-
rigendo illius intemperiem, &
digerendo excrementa.*

℞. pulueris coriandri præparati &
ros. rubearum añ. 3. j. gummi iuniperi
3. iij. gariophylorum 3. j. ß. salis tosti 3.
ij. pulueriscentur omnia & fiat cucufa
f. ar.

Ad idem aliud.

℞. corticum papaueris albi 3. ij. co-
riandri præparati & ros. añ. 3. ij. gummi
iuniperi 3. vj. gariophylorum 3. iij. salis
tosti 3. ij. pulueriscentur & fiat cucufa
f. artem.

De roborantibus cor.

Omnia medicamenta cardiaca, vulgo
cordiales, ad roborandum cor idonea
sunt; potissimum tamen commendan-
tur ad promptam & subitam animalium
spirituum regenerationem, & inter om-
nia vinum optimum & generosum ma-
ximè

ximè commendatur. Quod possit reficere vires & deperditam spirituum substantiam restaurare, ex Gal. est lib. de comp. med. secund. locos 4. capite ad finem. Solent etiam roborantia cor medicamenta dici, quæ nata sunt cordis interperiem corrigere, idque contraria inducta qualitate, tum etiam & quæ discutientem flatus facultatem habent, cor etiam roborare solent & similiter quæ à tota substantia venena destruunt, ut sunt alexipharmaca medicamenta. Verum sit ut in animi deliquia non semper eadem medicamenta conducant, cum ex variis causis fieri soleat. Verum si ex defectu alimenti dissipata virium substantia animi deliquium contingit, ad roborandum cor vinum idoneum erit, non solum in potu sumptum, verum etiam naribus admotum, quibus etiam utiliter admouetur ad eundem usum, in omni deliquio à quacunque causa proueniat vinum quoque conducit, cum ex ipso promptè spiritus reficiantur.

Est autem aduertendum, quod perpetuò ad tres partes vini vna aquæ admiscea-

miscetur & si possit æger opham panis
vino madefactam accipere, melius vi-
num id efficiet. Si autem deliquium
contigerit oppressio corde ob copiam
spirituum, quod accidit aliquando in
cordis palpitacione, tunc discutientia
flatus idonea sunt, vt confectio cord.
gent. contra melancholiam.

Accidit autem aliquando ægrotantes
præ nimio langore, non posse confectio-
nes accipere, tunc vtiliter sequens pul-
uis præscribitur, cuius vna pars sumi po-
terit cum vino, aut cum iure gallinæ, id-
que breuissimè, nec multo interposito
tempore ab vna vice ad aliam, semper
tamen in pauca quantitate, vt possint à
calore languido alterari. Est autem pul-
uis sequens.

℞. pulueris Diacamaronis & arom.
ros. Gab. añ. 3. j. s. pul. diarhod. Abb. 3. ij.
misce.

Aqua vel decoctum melissæ vel cor-
ticum citri, roborare solet cor, conserua
similiter ex melissa confecta ex rosis, &
buglossa.

Vbi vero ex veneno, vel ob pestilen-

tena

rem febrem (ad cor autem promptè peruenire solet) animi deliquium acciderit, vt sit similiter in morsu alicuius animalis venenati, vt viperæ vel scorpionis, cancri, & huiusmodi, tunc alexipharmaca conueniunt, & quia in his proprium alexipharmacum ignoratur, commune alexipharmacum erit præscribendum, quod theriaca magna vocatur. Sunt etiam & medicamenta quæ possunt ob inimicam illorum facultatem à manifesta qualitate pugnantem impedire; vt sunt bolus Armenus, scordium verum, ex quo aqua distillata, conserua & puluis parari solent in febribus pestilentibus: sunt namque maximè utilia, tum etiam in his qui assumpserunt auripigmentum & sublimatum, & alia huiusmodi.

Confectio ad hos usus.

℞. theriacæ magnæ ℥. j. pulueris scordei veri & boli armeni præparati añ. ʒ. j. confect. hyacinthorum ʒ. iij. conser. scordei veri ʒ. β. syr. acet. citri, vel

vel buglossæ q. s. misce & fiat cōfectio,
ex hac sumatur quantitas vnius amygdalæ pro vnaquaque vice, cum aqua vel decocto scordei veri, vel chicorij viperini, vulgo scursonera.

Ad idem potio.

℞. theriacæ magnæ ʒ. j. pulueris scordei veri, & boli armeni præparati añ. ʒ. ss. syr. acetositis citri ʒ. j. aquæ chicorij viperinæ q. s. misce & fiat potio. In febribus malignis conducunt aquæ acetosæ loco scursoneræ.

De roborantibus hepar.

Hepar roborant & illius substantiam adaugent, quæ dulcia sunt potissimum, quod aperte colligitur in auibz quæ saginantur vel nutriuntur lacte, tum etiam in senibus qui fructibus dulcibus saturantur: hac etiam ratione caro pas-sularum ad roborandum hepar vtiliter commendatur, cyphoides compositio ab Andromacho tradita in hydrope curan

randa à medicis obseruari solet, sumpta
quantitate trium cocleariorum nocte
cum ꝑ. vj. vini albi & generosi, de huius
laudibus lege Gal. 8. de comp. secunda
locos.

Conducunt etiam ea quæ sunt fri-
gida & subamara & moderatè adstrin-
gentia, potissimum ad calidas intempe-
ries curandas, & inter hæc chicoreum
potissimum commendatur, quæ non sit
alba, sed viridis & subamara; nec solum
illius decoctio utilis est, verum etiam
ipsum cichorium coctum cum aceto
dilutum & saccharo paratum.

Ad eosdem vsus commendatur con-
serua ex floribus chicorei, quæ in offici-
nis subinde non seruatur, est autè illius
eadem conficiendi ratio ac reliquarum.

Agrimonia herba dicta, etiam hepar
corroborat, potissimum in frigidis he-
patis intemperiebus, ab obstructione
prouenientibus, verum in his curandis
quotidie medici describere solent aqua
decoctam cum agrimonia, quæ vulgaris
consuetudo quotidie à medicis serua-
tur. Puluis etiam Diarrh. Abb. & Electua-
rium

ium ex ipso confectum solent hepar
corroborare.

Electuarium ad roborand. hepar.

℞. pulueris Diarrh. Abb. ℥. iij. cōser.
corū chicorij ℥. iij. sacch. dissol. in aqua
chicorij q. s. misce & fiant tabulæ pond.
℥. ij. Sunt & alia quæ exterius applicata
hepar roborare solent, cum illius exolu-
tionem prohibeant, vt est oleum cito-
niorum, oleum de absinthio, quæ duo
moderatè adstringant, ad illum
commendantur: vnde in curandis
inflammationibus hepatis semper cum
digerentibus permiscantur vbi occasio
est digerendi humorem in hepate con-
tentum. Optima ergo ratione cum oleo
chamomellino habente vim digerendi,
dicta olea permiscantur in hac forma.

℞. olei cham. ℥. iij. olei de absinthio
& citoniorum añ ℥. ij. misce.

Ad roborandum ventriculum.

Roborant ventriculum omnia aro-
matica & potissimum cinnamomum,
semina similiter calida & potissimum
fœnicu

fœniculi & anisij: melissa similiter ventriculum roborat, & spica nardi. Sunt etiam & alia composita medicamenta, quæ ventriculo dicuntur familiaria, & si vim habeant euacuandi ex ventriculo & primis venis, simul enim roborant, ut est potissimum pul. hieræ s. Gal. cuius meminit Gal. variis in locis, & potissimum 8. de comp. secund. locos cap. 2. quam hieram ex aloë ipse appellat ad humidam potissimum & frigidam ventriculi intemperiem corrigendam, ubi potissimum vomitus vel nausea adfuerint, quæ duæ notæ potissimum sunt observandæ in eiusdem exhibitione iuxta Galeni doctrinam dicto loco. Est enim hoc medicamentum valde utile, non solum ad bilem flauam educendam, verum etiam ad tergendam pituitam in ventriculo contentam, quam actionem perficere scimus aloëm ob illius amaritudinem. Solet etiam hoc medicamentum aliquando propinari in febribus, quando ventriculus afficitur, & tunc cassia vnâ cum hiera est permiscenda ad tollendam caliditatem medicamenti, est
autem

autem administratio huius medicamen-
ti talis.

℞. pul. hieræ s. Gal. ʒ. v. rod. ʒ. de-
cocti hord. & fæn. q. s. misce & fiat
potio.

Alia in febris.

℞. pul. hieræ s. Gal. & cassiæ fistulæ
recenter extractæ añ. ʒ. iij. rod. mellis
ʒ. j. decocti hord. & fæn. q. s. fiat potio.

Possunt quacunque hora diei vel no-
ctis propinari prædictæ potiones, licet
nullus præcesserit syruporum vsus.

Est & aliud medicamentum ventri
accommodatum ad roborandum ipsum,
ubi debilitatur ob crassorum humorum
multitudinem, idque citra manifestam
qualitatem, quod vocatur diospolitici-
con, cuius meminit Gal. 4. sanit. tuend.
cap. 5. quod desumpserat ex Dioscoride
de materia medicinali cap. 131. pipe-
re pro anetho posito, cum in reliquis si-
milis sit compositio. Præscribitur in
schedulis sic.

℞. diospolitici medicam. ʒ. iij. sic
quantitas coclearium vnum manè cum
optimo

optimo vino & generoso, non tamen tenue: hoc enim facultatem habet attenuandi, discutiendi, & conficiendi succorum crassitiem citra manifestam qualitatem, vt docet Gal. Oximel simplex idem præstat, vt à Gal. ad eosdem vsus. eodem cap. præscribitur, tum etiam & secundo ad Glau. cap. de accidentibus febrium in animi deliquio, quod oritur ex superabundantia pituitæ & succorum crudorum; conducit etiam ad roborandum ventriculum Diacidonites ex descriptione Gal. 8. de comp. med. secund. locos cap. de pharmaco ex succo malorum citoniorum. In schedulis sic præscribitur.

℞. Diacidonites ℥.iiij. sit dos. coclearia duo cum vino optimo non admodum renui.

Puluis etiam arom. ros. Gab. ventriculum roborat, & similiter puluis rosaræ nouellæ.

Exterius sunt aliqua quæ applicantur ad roborandum ventriculum, inter quæ sunt oleum de absinthio, oleum nardinum, mastichinum, irinum, & emplastrum

strum sthomaticon. confort. caro malorum citoniorum vino cocta & madefacta, impresso pauco puluere cinnamomi aut mastichis, & rosarum siccarum in forma micæ panis vulgariter dictæ. Ex dictis oleis potest parari vnguentum ita.

℞. olei Irini & nardini añ. ℥. j. ole. de absinthio ℥. β. massæ emplastri sthomaticonis confort. ℥. iij. ceræ parum misce & fiat vnguentum.

Ex dicto emplastro fiunt emplastra (vulgo pegados) ad formam scuti, ad roborandum etiam stomachum & sedandam fluxionem ventris mirabiliter, in schedulis præscribitur ita.

℞. massæ emplastri sthomaticonis confortatiui ℥. iij. extendatur super alutam ad formam scuti pro stomacho.

Quod apponi debet supra ventriculum, ita vt acutior pars ad mucronatam cartilagine[m] apponatur prope ipsum, ita vt latior pars super ventriculum extendatur. Hæc medicamenta in dysenteria & dyarrhæa vtiliter commendantur & potenter iuuant.

Vterum roborantia.

Inter simplicia vterum roborantia sunt aqua, & decoctum melissæ. Inter composita Diamusculus dulcis & vsualis, confectio gent. cord. cont. mel. Ambar, gallia moschata, ex quibus sequens potio parari solet.

℞. Diamusculi vsualis & confect. gent. cont. mel. añ. ʒ. j. pul. arom. ros. gab. ʒ. ij. syr. corticibus citri ʒ. j. aq. melissæ q. s. misce & fiat potio. Exterius ad vterum roborand. aliqua applicantur, vt sunt oleum rutaceum, laurinum & nardinum manibus dicto oleo madefactis fricando, postea in regione vmbilici sequens emplastrum apponatur.

℞. massæ emplastri sthomaticonis confort. ʒ. j. galbani depurati ʒ. ij. galliæ moschatae ʒ. j. β. musci & ambræ añ. grana vij. olei nardini & sambucini parum misce, & extendatur supra pannum ad formam rotundam pro vmbilico.

Dicta omnia quæ de roborantibus dixi, intellexi postquâ præcesserint vniuersa

uersales euacuationes, nisi magna urgeat necessitas, nam tunc indicatione sumpta ex partis virtute defficiente reliquas omnes indicationes antecellit.

DE SANGVINIS missione.

Magnus medicinæ fructus est sanguinis missio, cum omnibus antecellat medicamentis, & omnibus ferè affectibus conueniat; nam pletoricis, ætate florentibus, temperaturis calidis & humidis, robustis, consuetis, tempore veris & autumnis, inflammatione, febribus omnibus putridis & aliis similibus conuenit.

Sanguis in nostro corpore est duplex, sanguis arterialis, & sanguis venalis, ille in corde genitus per arterias ad omnes partes viuentes mittitur; iste in hepate elaboratus per venas tam magnas quàm paruas, quasi per canales defertur. Cor autem cum sit primum viuens & vltimum moriens, sua actione & virtute vel facultate, vt viuant partes, spiritus

vitales simul cum suo sanguine, median-
ribus diastole & systole mittit; quod sua
solūmodo expultrice facultate hoc fa-
cere videtur, quæ tam subita est hæc
actio & improuisa quod miro artificio
exercetur. Arteriæ namque omnes si-
mul dilatantur & comprimuntur (etsi
sint in partibus longinquis) quando di-
latatur & comprimitur cor, quod si-
gnum est non fieri hæc actionē nisi à fa-
cultate expultrice cordis. Ille sanguis
arterialis in corde, vt dixi, generatus
à puriori sanguine venali, sua ipsius cor-
dis facultate attractrice acquisito, & at-
tracto : & ab hepatis expultrice misso,
nullo modo potest à subiecto corporis
humani separari quin sequatur mors sta-
tim, vel saltem extremum vitæ pericu-
lum. De hoc sanguine quādo de missio-
ne sanguinis loqui sunt omnes medici,
nulla fit mentio : solū de sanguine ve-
nali qui in venis reperitur, intelligen-
dum venit. Hic namque est ille sanguis
qui in hepate oritur & generatur, & à
facultate propria expultrice per venas
expellitur, à venis sua attractrice acqui-
ritur,

ritur, & ab omnibus partibus ad sui nutritionem & conseruationem attrahitur & retinetur. Ipse inquam est ille sanguis qui mediante phlebotomia vel euacuatur, vel reuellitur, vel deriuatur à parte vel à partibus, vbi aliquis vel aliqui affectus reperiuntur. Quapropter si hæc dicta bellè & absque cauillationibus ab omnibus considerentur, quomodo possit medicus absque periculo ægrotantis, sanguinis missionem exercere, facillimo negotio inuenietur: nam sã guis in venis, tam in magnis quam in paruis (vt dixi) semper cõtinetur; si quantitate vel qualitate peccat, profecto, nullo intercedente impedimento, semper sanguinis missio erit proficua, tam ratione quantitatis quam qualitatis. Nam si solum sanguis quãtitate excedat, nõne ipsa deficiente natura ab oppressione leuata, vt docet Gal. 2. *Aph. com.* 29. melius concoquet id quod restat & sibi obnoxium est, & melius separabit, & deinde ad expulsionem optime se exercebit? si peccat qualitate, nõne etiã illa diminutio erit proficua per sanguinis missionem

facta, cum humor qualitate peccans in ipso sanguine mixtus euacuetur? Eadem est ratio si reuulsionis gratia fit phlebotomia: nam si redūdantia (vt ita loquar) humoris ad aliquam partem vbi putrescit humor fluit, (vt in febribus putridis in principiis morborum accidere solet) quæ pars focus putredinis dicitur, nōne sanguinem mittere ne fluat ad focum, conueniet? Pariter etiam conueniet quando fit sanguinis missio deriuationis gratia, nam si in aliqua parte humor redundat, & possumus illam redundantiā sanguinis missione ex eadem parte vel viciniore extrahere, nōne illa deriuatio erit salutaris licet illa redundantiā non sit ad vasa? Vnde sanguinis missio non solum in morbis à sanguinis copia ortis, administrari potest; verum etiam & cum ab aliis humoribus excitatur, semper enim maximum naturæ leuamen inducet. Solum animaduertere oportet, quæ docet Gal. lib. de cucur. scar. cap. 16. quo in loco hæc verba scribit. *Oportet autem antequam eas adhibeamus* (loquitur enim de scarificatione cucurbi

cucurbitularum) ventrem iam emolli-
tum fuisse, aut omnino nullam infestan-
tium excrementorum adesse suspicionem. Ex
quibus verbis demonstrat non esse exer-
cendam sanguinis excretionem quin
prius sit lenitus venter; si igitur in ista
leui euacuatione præcipit Gal. ventrem
lenire, quanto magis oportebit illum
expurgare in magna euacuatione facta
per sanguinis missionem? Semper ita-
que sollicitus sit medicus antequam ve-
nas incindere præcipiat, vt leniatur ven-
ter aliquo clystere, vel vomitorio, vel
medicamento solum facultatem habente
euacuandi ea quæ sunt in primis ve-
nis, aliter enim non erit naturæ imitator.
Atque hæc de materia medica & san-
guinis missione breuiter dicta sint.

DE FACULTATIBVS
*medicamentorum compo-
sitorum & dosibus.*

L Icèt in tractatu de materia dicta
fuerint multa quæ ad facultates &

doses medicamentorum pertinent, nihilominus tamen, ut omnes fructus necessarij ad morborum curationem in hoc opusculo reperiantur, & statim inueniat medicus ipsas facultates & doses in vnoquoque composito, visum fuit breuiter scribere, quæ à nostris Valentinis medicis circa praxim exercentur. Est namque maximi momenti facultates & doses in quocunque euentu & occasione in promptas habere manus: non enim semper consulere libros potest, antequam de remedio deliberet medicus, cum sit periculum in mora propter vrgentes necessitates. Quare ad ea peruenire iam tempus adest, solum primum aduertat velim, quòd medicamenta aliqua simplicia inter composita reponuntur, quoniam arte parantur, & etiam non in omnibus inuenietur dosis, sed solum facultas medicamenti, cum non sit necessaria illius dosis ad prescribenda medicamenta, quæ dosis minima pro pueris & delicatis, summa verò pro robustis erit.

Aqua

Aqua ex quinque radicibus.

Facultatem habet præparandi humores pituitosos & crassos in venis gibbæ hepatis partis existentes, & ad calculosos affectus, vt in nephritide ex calculo & arenis. Dosis minima ℥. iiij. maxima ℥. vj.

Aqua Angelorum.

Optima est exterius apposita in cordis palpitacione, ad rarefaciendum habitum corporis, & aliquantulum discutiendum flatus, ex qua fomenta parantur aut per se aut cum quibusdam aromaticis medicamentis; valet etiam ad affectus matricis.

Rob vel sapa vini.

Habet facultatem cohibēdi fluxiones sua adstrictione, & distillationes acres & mordaces, si paratur cum diacodion. Gal. ex capitibus papaueris nigri.

Rob mororum.

Habet insignem facultatem repellen-

di si cum decocto hordei & fol. plantaginis in angina in principio præscribitur.

Rob. citonorum.

Ventriculum roborat & refrigerat.

Iulep rosarum.

Habet vim frenandi bilem, contemperandi calorem, & roborandi viscera interna. Dos. ab ℥.j. ad ℥.iiij.

Iulep violarum.

Facultatem habet mitigandi ardores urine ex pituita salsa, preparandi humores biliosos, valet ad lambendum, simul cum aliis syrupis expectorantibus, optimus est in maximo æstu tum ventriculi, tum totius corporis, & in lassitudine phlegmonosa. Dos. ab ℥.j. ad iiij.

Syrupus rosarum viridium.

Ad compescendum bilis feruorem
valet

valet & ad superpurgationes. Dos. ab
℥.j. ad ℥.iij.

Syr. Zizinarum.

Optimus est in affectibus trachiarte-
riæ ex asperitate aut siccitate contra-
ctis, habet enim facultatem leniendi ci-
tra vllam acrimoniam, & gustui est gra-
tissimus. Dos. est vt sensim deglutiatur.

Syr. borraginis & buglossæ.

Valent ad præparand. pituitam sal-
sam & contemperandam illius acrimo-
niam, & ad emendandam siccitatem
quam plurimorum syruporum. Dos. ab
℥.ad ℥.iij.

Syr. ros. siccarum.

Optimus est hic syrupus in diarrhæa
in hæmorrhagia, in muliebri profluui-
o, & in quocunque affectu in quo opor-
teat sanguinem sistere. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. de succo endiuie.

Valet ad liberandum hepar & venas

mesenterij ab obstructionibus, & præterea roborat ipsum hepar, tum etiam est optimus ad præparandam bilem, nam succus endiuiae ex quo paratur frigidus est & siccus & modicè amarus; proinde tergendì habet facultatem, & illius siccitas emēdatur permixtione sacchari propter lentorem. Dosis ab ℥.j. ad iij.

Syr. acetositis citri.

Habet facultatem refrigerandi, incindendi & attenuandi & penetrandi, & refrenandi bilem, contemperandique cordis calorem, proinde commodissimè eo utimur in febribus ardentibus, in pestilenti constitutione, in morbillis & variolis, in febre punctulari. Dosis ab ℥.j. ad iij.

Syr. acetositis limonum.

Easdem ferè habet vires sicuti de citro, tantummodo differunt quoniam magis tenuis sit quam syr. acetositis citri: dos. etiam est eadem.

Syr. de Agresta.

Facultas est optima sistere modicè
flu

fluxiones, ad roborandum ventriculum, ad corrigendum calorem & æstum, eo igitur utimur ad frenandam bilem in diarrhæa biliosa, in tenesmo, & dysenteria. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. citoniorum.

Habet potentiores vires quam syrupus de agresta ad cohibendas fluxiones, ad roborandum ventriculum, sed non constat adeò tenui substantia ac ille, utimur eo cum pane tosto & in eo madefacto in prima mensa ad roborandum ventriculum, ut amplectatur alimenta, & præterea additur hic syrupus in portionibus ex mirobolanis, & in illis qui parantur contra casum & in omnibus in quibus in animo est roborare. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. oxalidis vel acetosæ.

Optimus est in febribus puncticularibus, in morbillis & variolis, tam per se quam dum ex eo confectiones cardiacæ parantur. Dos. ab ℥.ij. ad v.

Syr.

*Syr. de succo fumiterræ simplici
cum saccharo.*

Est optimus in lue venerea, præsertim
in gonorrhæa & scabie. Dos. ab .j.ß. ad
℥. iiij.

Syr. cap. veneris.

Valet ad expectorandum: nam lenit
& cum securitate incindit humores exi-
stentes in cauitate vitali, paulatim de-
glutiendo illum, proinde optimus est in
orthopnæa & asthmate, est vehiculum
pluribus medicamentis, prouocat men-
ses, præparat etiam humores pituitosos
& melancholicos. Dos. ab ℥.ß. ad ℥. ij.

Syr. Pimpinellæ.

Hic syrupus fit eodem modo, quo pa-
ratur syr. cap. ven. habet facultatem in-
cindendi & attenuandi humores crassos
in gibba hepatis parte contentos, & ve-
nis magnis. In febribus etiam intermit-
tentibus est mirabile remedium ac etiam
in

in omnibus febribus, vbi per vrinas natura incipit humores expurgare. Dos. ab ℥.β. ad ij.β.

Syr. liquiritia.

Optimus est in catarrho, in pleuritide, in orthopnæa, in tussi, in asthmate, in asperitate trachiarterie, & in quibuscunque pectoris affectibus. Valet etiam ad præparandam pituitam, ad renum affectus & ad calculosos, ad gonorrhæam, ad modicè vrinam prouocandam. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. limonata mellis.

Vruntur mulierculæ hoc syr. incindendos humores crassos ventriculi, & eos modicè tergendos in pueris lactantibus.

Syr. miuæ citoniorum simplex.

Habet facultatem roborandi ventriculum, iuuat coctionem, sistit fluxiones,
pro

proinde eo utimur in lienteria, in diarrhæa, in vomitu ex imbecillitate retentricis. Dos. ab ℥. β. ad iij.

*Syr. rosarum alexandrinarum ex
nouem infusionibus.*

Optimus est ad purgandam bilem & humores serosos in venis cōtētos, frequentissimus est illius vsus ad parandas potiones & confectiones purgantes. Dos. ab ℥. ij. ad ℥. v.

Rodomel rosarum alexandrinarum.

Habet easdem vires, sed imbecilliores, cum solum habeat duas infusiones, nam si omnes haberet esset calidior. Dos. ab ℥. ij. ad iiij.

Rodomel rosarum rubearum.

Valet ad euacuanda excrementa pituitosa ventriculi, ad modicè tergendum, abluendum, roborandum eundem ventriculum, proinde nulla est
ætas

ætas & nullum ferè temperamentum in quibus non possimus commodè uti in affectibus ventriculi, & præterea in paralyfi, apoplexia, epilepsia, convulsio- nū speciebus, capitis dolore, distillatione & similibus ortis ex materia pituitosa. Dos. ab ℥. j. ad iiii.

Syr. acetosus simplex.

Habet vim hic syrupus contempe- randi calorē humorum acrium & mor- dacium, quod præstat sua frigida facul- tate, præterea materias frigidas & cras- sas incindit, attenuat, tergit ex modo substantiæ aceti scilicet, propter illius tenuitatem, & proinde eo utimur ad incindendum & attenuandum humo- rem melancholicum, in quartana & in spleniticis. Dos. ab ℥. ij. ad iiii.

Oximel simplex.

Optimum est ad incindendum & atte- nuandum & liberandum ab obstructio- nibus, ad auacuandum sputum, sine ma- nife

nifesto calore, proinde fere semper cum omnibus syrupis expectorantibus permiscemus oximel, & præterea illud pueris exhibemus cum rodomelle permixtum, eo etiã præparamus pituitam, licet in longinquis venis contineatur, hinc in Arthritide, in Podagra, Chiragra, & similibus affectibus. Denique cum oximellite trochiscamus Agaricum ad confectiones vel potiones parandas. Dos. ab ℥. j. ad ℥. ij.

Syr. de Bisantijs.

Est optimus ad febres diuturnas curandas: nam est mediocris facultatis in deobstruendo, proinde in omnibus hydropis speciebus propter venarum obstructiones à quibus hepar liberatur & illius intemperiem frigidam corrigit, tum etiam in cachexia optimus est. Dos. ab ℥. j. ad ij.

Syr. granatorum. I. oxisaccharum simplex.

Frequentissimus est vsus in morbillis

&c

& variolis, incindit & attenuat etiam
numores crassos ratione aceti, frangat
bilem & feruorem eius mitigat. Dos. ab
℥. ij. ad iij.

Syr. de corticibus citri.

Gratissimus est hic syr. gustui & iu-
cundissimus odoratui, habet facultatem
roborendi ventriculum, hepar, & cor,
& illorum intemperiem frigidam mo-
dicè emendandi, est etiam optimus in
uterinis affectibus, in palpitatione cor-
dis, quovtimur cū aliis syrupis, vel ex eo
paramus cōfectiones cardiacas, discutit
etiam flatus. Dos. ab ℥. j. ad ij.

Syr. loch caulium.

Optimus est ad tergendā excrementa
thoracis puerorum, atque incindit, atte-
nuat & concoquit excrementa ventri-
culi ipsorum. Dos. à ℥. iij. ad ℥. j.

Syr.

Syr. papaueris.

Optimus est ad sedandum dolorem in ardore urinae quando vrget, valet etiam ad conciliandum somnum. Dos. ab ℥.β. ad j.

Syr. nenupharis.

Hic syrupus optimus est ad eosdem affectus ad quos syr. papaueris, sed mitioris est facultatis; & ita vtuntur hoc syrupo medici in calida renum intemperie ex qua sequitur diabetes, & praeterea in erysipelate & aliis affectibus calidis. Dos. ab ℥.β. ad ℥.ij.

Syr. de Absinthio.

Valet ad roborandum ventriculum, ad corrigendam intemperiem frigidam, & ad iuuandam coctionem. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr.

Syr. de mentha.

Roborat optimè ventriculum & valet ad necandos vermes. Dos. ab ℥. j. ad iij.

Syr. de endiuiā compositus.

Optimus est ad corrigendam calidam hepatis intemperiem, ipsumque roborat & liberat ab obstructionibus: tergit namque, modicè incindit & attenuat: proinde quotidie ad humores præparandos in omnibus ferè febribus describunt medici hunc syrupum. Dos. ab ℥. j. ad ℥. iij.

Syr. Regis. Sabor. i. buglossæ.

Facultatem habet præparandi humorem melancholicum in hypochondriaca affectione, in quartana, in mania, in melancholia, & in similibus affectibus ortis ex attrabile. Dos. ab ℥. j. ad iij. & si sumatur ℥. iij. aliquo modo habet facultatem purgandi dictos humores.

Syr.

Syr. Diamoron.

Optimus est in principio Anginæ: nam
sistit fluxionem. Dos. ℥. β. ad ℥. j.

Syr. Dianucum.

Facultatem etiam habet repellendi
& cohibendi humores in Angina in
forma gargarismatis cum decoctione
plantaginis. Dos. eadem est.

Diacodion Galeni.

Vtuntur medici cum sapa in distil-
lationibus humoris acris & mordacis &
in diarrhæis biliosis & ad somnum in-
ducendum; cum melle vero ad incin-
dendam & attenuandam materiam exi-
stentem in thorace. Dos. ab ℥. β. ad. iij.

Syr. de hyssopo.

Facultatem habet extergendi & in-
cindendi humores in cavitare thoracis
existentes,

existantes, habet etiam vim præparandi
pituitam falsam in ardore urinae, & lenit
dolorem illarum partium. Dos. ab ℥.ß. ad
℥.ij.ß.

Oximel compositum.

Vtimur hoc syrupo dum intensius
volumus expectorare, itaq; in asthma, in
orthopnæa & pluritide si leuiores ex-
pectorantia non sufficiant possumus uti
hoc composito oximellite. Dos. ab ℥.ß.
ad ℥.ij.

Oximel schilliticum.

Nullus est alius vsus quàm ad expe-
ctorandum, ac proinde in affectibus in
quibus rebellis est humor & contumax
propter crassitiem, viscositatem & len-
torem vtimur hoc syrupo, præsertim
ubi affectus sunt lethales. Dos. ab ℥.ß.
ad ℥.j.

Syr. de fum. terræ compositus.

Optimus est ad modicè euacuan-
dum, proinde eo vtimur in lue Gallica
dum

dum syrupos longos paramus, quo utimur loco sacchari; præparat etiam humorem melâcholicum in pruritu, & lepra, quo nunquam utendum est, nisi præcesserint generales euacuationes. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. de Epithimo.

Vim habet & facultatem purgandi quoscumque humores adustos & illos præparat, & in morbo Gallico etiam peractis vniuersalibus euacuationibus, ut dictum est de syrupo fumiterræ comp. sub eisdem dos.

Syr. de duabus radicibus.

Optimus est hic syrupus ad præparandam pituitam existentem in partibus lóginquis, ad aperiendas obstructions, hepatis lienis, & præcipuè renum, proinde in calculo affectis utimur hoc syrupo cum syr. cap. ven. Dos. ab ℥.j. ad ℥. iij.

Syr.

Syr. de quinque radicibus.

Ad eosdem affectus optimus est ad quos diximus commendari syrupum præcedentē de duabus radicibus, quamvis iste minoris facultatis sit propter minorem quantitatem aceti, quantitas eadem est.

Syr. de eupatorio.

Facultatem habet aperiendi obstructions hepatis & corrigendam eius intemperiem frigidam, & ita in qualibet hydropis specie eo utimur dummodo non sit febris. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. de mucillaginibus.

Optimus est si quis alius ad sedandum dolorē in urinae pruritu, ad emendandum calorem in ardore urinae, ad modicē diluendum pituitā salsam, materiam huius affectus & causam, sed describendus est hic syrupus prius per;

K

actis euacuationibus necessariis, ne scilicet humor ad partem affectam ducatur, & præterea huius medicamenti vsus sit per plures dies, vt per duos aut tres menses, quo tanquam securissimo possumus vti diebus Canicularibus cum decocto liquiritiæ, hordei, maluarum, & similium. Dos. ab ℥.ij. ad v.

Syr. oxisacchari compositus.

Frequentissimus vsus est ab obstetricibus in pueris ad modicè incindendum & attenuandum humorem pituitosum, quem permiscet cum syr. Bisantino, optimus est etiam ad prouocandam vrinam. Dos. ab ℥. j. ad ℥.ij.

Mina citoniorum aromatica.

Optimus est hic syrupus ad roborandum ventriculum, & ad corrigendam intemperiem frigidam hepatis: iuuat enim coctionem, excitat appetitum, sistit vomitum ex imbecillitate retentricis & deiectionem; proinde optimus est

Medicina.

219

est in lienteria si absit febris. Dos. ab
℥. j. ad iij.

Syr. Artemisiae.

Valet ad menstrua prouocanda, ad
incindendos & attenuandos humores
crassos, ad liberandum vterum ab ob-
structionibus, & ad insigniter calefa-
ciendum illum. Dos. ab ℥. β. ad ℥. ij

Syr. de Scolopendria. S.

Cuius vsus securissimus est in affe-
ctibus lienis, scilicet ad lienem deob-
struendum & roborandum. Dos. ab ℥. j.
ad iij.

Syr. de Scolopendria. C.

Cum felicissimo successu vtimur hoc
syropo in quartana, in lienis scirrho ad
præparandos humores melancholicos.
Dos. ab ℥. β. ad ij.

K r

Syr. de Betonica.

Optimus est, ad corrigendam frigidam intemperiem cerebri, nam incindit & attenuat humores viscidos & lentos, & ipsos tergit, roborat cerebrum & modicè flatus discutit, optimus est in paralyfi, in paraplexia & conuulsione à repletione, & similibus affectibus. Dos. ab ℥.j. ad iij.

Syr. sthecados.

Habet easdem facultates & doses, ut supradictus de Betonica.

Acetum rosaceum.

Vim habet refrigerandi, exsiccandi, roborandi & penetrandi propter tenuitatem substantiæ, & proinde in parando oxirhodina addimus acetum rosaceum, propter penetrationē cuius siccitas corrigitur oleo rosaceo, tum etiam & aqua rosacea: possunt etiam parari plura vnguenta.

unguenta, multa cerata in renum intemperie calida, in hectica, & aliis similibus.

Acetum schilliticum.

Huius usus ad interna non est tutus & securus, valet in fetido oris odore excrementis retentis, in gingiuis, aut ex carne putrefacta gingiuarum: nam tergit, exsiccat, incindit, attenuat, diuidit, & excrementa expurgat, valet etiam ad unguenta paranda ad incindendum & attenuandum crassos humores, ut in paralyti & similibus affectibus, in quorum usu pro singulis unciiis unguenti addimus 3. j. vel ij. dicti aceti.

*DE CONSERVIS.**Conserua rosarum.*

Habet vim hæc conserua roborandi facultatem retentricem, & si antiqua sit, sistit fluxiones, proinde ad confectiones parandas addimus cum reliquis 3. j. huius conseruæ, tum etiam si paretur ele-

Electuarium in tabulis ad roborandū ventriculum, vel ad cohibendam fluxionem, quod possumus facere in muliebri profluvio, sanguineo in sputo, in diarrhæa, & similibus affectibus possumus prædictum electuarium ex hac conferua, temperie modicè frigida & sicca, quamvis tam caliditas quàm siccitas rosarum retundantur. Possumus vti hac conferua in febribus cum potu aquæ frigidæ, præcipuè in declinatione principio accessionum, hocque ratione putredinis solum, non autem in principiis febrium, neque in augmento; nam iuuaretur obstructio. Dos. ab ℥. β. ad ij.

Conserua florum borraginis & buglossæ.

Habent facultatem modicè calfaciendi & humectandi, proinde in affectibus melancholicis vtimur his in tempore intermissionis medicamenti purgantis ad exhibitionem alterius medicamenti, vt ℥. conser. borraginis & buglossæ añ. ℥. iij. sacch. ℥. iij. fiat conditum,

tum, & si sint aperiendæ aliquæ ob-
structiones, addimus his puluerem diar-
rhodonis Abbatis, vel similem huic: si
vero discutiendi sint flatus, rosatæ no-
uellæ vel aromatici rosati gab. vel cin-
namomum causâ penetrationis, vel ne
lubricum reddant ventrem propter hu-
miditatem. Ex his eisdem conferuis
possunt parari confectiones, vel electua-
ria, vel boli cum aliis medicamentis per-
mixtis. Dos. ab \mathfrak{z} . β . ad ij.

Conserua oxalidis. I. acetosæ.

[Vis inest refrigerandi & exsiccandi
cum tenuitate substantiæ, cuius vsus est
optimus ad parandas confectiones in
febris puncticularibus, in morbillis
& variolis, tum in febris malignis,
tum & in affectibus in quibus oportet
altius refrigerare & aliquo modo cohi-
bere fluxionem, possumus etiam vti in
electuariis vt supra. Dos. est eadem.

Conserua violarum.

Frigida & humida est hæc conserua,

& si recens sit lubricando mouet aluum:
parantur ex hac conferua medicamenta
dicta linētus & electuaria ad asperitates
trachiarteriæ, tum etiam hæc est con-
ferua, ex qua in officinis paratur syrupus
violarum per annum. Dosis illius eadem
est ac conferuæ borraginis.

Conserua florum nymphææ.

Habet easdem facultates quemad-
modum conferua violarum, & easdem
doses.

Conserua florum chicorij.

Optima est ad modicè deobstruen-
dum hepar, illudque corroborandum, &
corrigendo calidam ipsius intempe-
riem. Dos. ab ℥.ß. ad ℥.ij.

Conser. cap. veneris.

Vtilis est hæc conferua ad aperien-
das obstructions modicè incindendo
& attenuando, & præsertim si obstru-
ctiões

ctiones in venis vteri sint, & præter id vehiculum est hæc conserua aliis medicamentis, licet facultate contrariis: proinde præterquam quod describitur in formam conditi, vt superiores conseruæ, describitur etiam hæc ad parandas cōfectiones in profluuiio muliebri, cum medicamentis quæ valent hunc fluxum cohibere; in qua forma pro ℥. iij. confectionis ex pluribus medicamentis paratæ iniicimus ℥. vj. vel vij. huius conseruæ, est enim in ea confectione sub actione transeuntis non verò sub actione rei permanentis. Dos. ab ℥. ad iij.

Conserua sthecados.

Habet vim calefaciendi & exsiccan- di cerebrum, quod etiam roborat, pro- inde ea vtimur dum repletum est ce- rebrum crassis humoribus, vt in paralyfi, conuulsione ex repletionem, in memoria deperdita & similibus affectibus. Dos. ab ℥. iij. ad ℥. j. β.

Conserua roris marini.

Easdem habet facultates & doses, &

præter dicta corrigit & emendat frigidam intemperiem ventriculi.

Aliæ multæ conseruæ possunt parari: verum omnes conspirant circa facultates supradictarum.

DE ELECTVARIIS.

Electuarium ex succo liquiritiæ.

Optimum est ad incindendos & attenuandos crassos humores in thoracis cauitate contentos, ad emendandam etiam asperitatem trachiarteriæ, vt in tussi, catarrho, & aliis similibus affectionibus.

Electuarium ex radice ireos.

Est eiusdem facultatis, sed potentius agit quam elect. de succo liquiritiæ, neque ita gratum est gustui.

Electuarium ex succo rosarum.

Valet ad purgandam bilem à 3.ij. ad 3.j.ß.

Electua

Electuarium ex semine cartami.

Purgat pituitam crassam ex partibus longinquis. Dos. à ʒ. ij. ad ʒ. ij.

Elect. Diarrhod. Abb.

Facultatem habet roborandi hepar post purgationem illius. Dos. à ʒ. ij. ad ʒ. ij.

Elect. rosata nouella.

Vtuntur medici hoc electuario in frigida ventriculi intemperie & in ventris subuersione, roborat namque illum & discutit flatus. Dos. à ʒ. j. ad ij.

Electua. diatrium santalorum.

Roborant hepar & ventriculum: dos. eadem est.

Elect. arom. rosati.

Vtuntur medici hoc electuario in in-

temperie frigida ventriculi, & ad discutiendos flatus, est etiam optimum medicamentum in palpitatione & affectibus vterinis. Dos. à 3. ad iij.

Elect. diacymini.

Ad discutiendos flatus & dolores ventris ab intemperie frigida ortos multum predest. Dos. à 3. j. ad iij.

DE SPECIEBUS LOCH.

Loch de schilla.

Optimum est in asthmaticis, in apoplecticis, in orthopnicis, & similibus affectibus, ad optimè tergendum & sumè incindendum crassa thoracis excrementa.

Loch de pulmone vulpis.

Prodest in pulmonis vlceribus, vt dicunt, à qualitate occulta.

Loch

Loch sanum & expertum.

Eo utimur ad lambendum in affectibus thoracis.

Loch lentium.

Valet ad morbillos & variolas quando afficitur guttur, permiscetur aliquando cum theriaca de citro ad eisdem affectus. Dos. à ʒ. β. ad ij.

DE PVLVERIBVS.

Puluis diatragacanthi.

Optimus est in consumptis, in marasmo affectis, in hecticis, in gutturis asperitatibus.

Puluis diapapaueris.

Est etiam optimus, ut supra, in hecticis præcipuè nimium vigilantibus.

Puluis

Pulvis electuarij resumptiui.

Habet etiam easdem facultates vt superiores, omnes enim sumuntur in pauca quantitate.

Pulvis diamargaritonis frigidi.

Hepar, cor, & ventriculum roborat & refrigerat; vnde vtimur hoc puluere in calida harum partium intemperie, in deliquiis animi. Dos. à ʒ.ß. ad ij.

Pulvis diarrhodonis Abbatis.

Corrigit calorem contractum ex medicamento purganti, & facultates laesitas roborat, tum etiam & obstructioni reliquias absumit. Dos. à ʒ.ß. ad ij.

Pulvis diatrium santalorum.

Optimum est hoc medicamentum a corrigendam calidam hepatis intemperiem, vt in diarrhæa biliosa, & aliis laborantibus.

rantibus prædicta intemperie, deinde
iecur roborat & illius obstructions
emendat. Dos. ab ʒ. iiii. ad ʒ. ij.

Pulvis letitia Galeni.

Calidus est & siccus in recessu secun-
di, & præditus substantiæ tenuitate;
proinde omnes affectus frigidos emen-
dat longin quarum partium, vt cordis &
cerebri, propter crocum, qui vt vaporo-
sus reliquorum simplicium facultates
ad cerebrum ducit, vnde in paralyticis,
apoplecticis, & similibus prodest. Dos. vt
supra.

Pulvis arom. ros. Gabrielis.

Hoc medicamentum est suauissimum
olfactui, & iucundissimum gustui, & sa-
luberrimum & securissimum in frigida
cuiusvis intemperie partis: propterea eo
vtuntur medici in paraplexia, paralyfi,
epilepsia, conuulsione ex repletionem, in
stupore, & aliis frigidis, viscidis & crassis:
nam hos humores incindit modicè &
attenuat,

attenuat, partes calfacit & easdem roborat, præterea in palpitiatione ventriculi & cordis optimus est : nam flatus modicè discutit, & easdem partes roborat corrigendo intemperiem. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ. j.ʒ.

Puluis diambra.

Omniſus viſceribus roborandis efficaciffima eſt diambra, ſi à cauſa frigida ſint imbecilla, nam reficit ſpiritus, fouet calorem natiuum, vteri affectibus prodeſt, & valde ſenibus & mulieribus conuenit. Dos. à ʒ.ʒ. ad ij.

Puluis roſatæ nouellæ.

Imbecillum ventriculum roborat, flatus diſcutit, appetentiam excitat, nauſeam ſedat, humores lentos incindit, colico dolori medetur & vomitum compeſcit. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ. j.ʒ.

Puluis Diacymini.

In regionibus frigidis vtuntur medi

Medicina.

332

ci hoc puluere ad discutiendos flatus.
Dof. à ʒ.β. ad ʒ. j.

Pulvis latificans Rhasis.

Ex hoc puluere parantur sacculi in
cordis & ventriculi palpitatione, pilei
aut semicucuphæ in frigidis cerebri in-
temperiebus, vt in memoria deperdita,
in apoplexia, & affectibus similibus. Præ-
terea possunt parari potus ex hoc pulue-
re addito aliquo liquore, veternis affe-
ctionibus & istericis. Dof. ab ʒ. j. ad
ʒ. iiii.

Pulvis pliris arcoticon.

Tutissimus est vsus huius medica-
menti in frigidis affectibus cerebri, vbi
opus est calfacere & flatus discutere.
Dof. est eadem.

Pulvis ducis.

Datur cum aquis diureticis in sup-
pressionem vrinæ ex calculo, arenulis, hu-
moribus

moribus frigidis, viscidis & lentis. Dos.
à ʒ. β. ad ʒ. β.

Pulvis electuarij resumptiui.

In marcore, febre hectica, & consum-
ptis vtuntur medici hoc puluere. Dos.
à ʒ. j. ad iij.

Pulvis diagalanga.

Discutit flatus ventriculi, hepatis &
cerebri intemperiem frigidam & humi-
dam corrigit, & aliquantulum vrinam
mouet. Dos. à ʒ. β. ad ʒ. ij.

Pulvis Regina Aragonum.

Obstetrices in abortu vtuntur fre-
quentissimè hoc puluere. possunt etiam
parari electuar. ad præcautionem abor-
tus. Dos. ʒ. ij.

Pulvis restrictiuus.

Frequentissimus vsus est ad conden-
sandum & incrassandum sanguinem, ad
compr

Medicine.

235

comprimendas & repellend. & ad fir-
mandas partes laxas & solutas, præci-
puus tamen vsus est ad externa in form.
linimenti aut cataplasmaris, in ossium
fracturis, in contusionibus & proflu-
uiis sanguinis narium.

Puluis contra vermes.

Optimus est ad vermes necandos.
Dof. à ʒ. ʒ. ad ʒ. j.

Puluis Papæ Benedicti.

Valet ad corrigendam ventriculi fri-
gidam intemperiem, in senibus, ad dis-
cutiendos flatus, ad prouocandam vri-
nam, ad consumendas humiditates &
excrementa quæ præcedunt, vt materia
calculi, & denique ad iuuandam coctio-
nem & roborandum cerebrum. Dof. ʒ.
ij. post prandium & cœnam.

Puluis contra casum.

Optimus est ad roborandas partes
internas

internas in caſu. Doſ. à ʒ.ij. ad iij.

Pulvis hieræ ſ. Galeni.

Vtuntur medici hoc puluere ad bilem purgandam ex primis tantum venis, quoniam ob terrenam ſubſtantiam non tranſit eius facultas ad hepar. Roborat etiam ventriculum, incindit atque attenuat humores illius craſſos. Doſ. à ʒ. j. ad ʒ. iiij.

Pulvis hieræ comp. & benediſta.

Vtuntur medici his pulueribus ad paranda ſuppoſitoria in affectibus frigidis cerebri & ventriculi.

Pulvis hieræ logodionis & hieræ diacolocynthidos.

Etiam vtuntur ad eodem affectus quando vehementer vrgent.

DE

DE TROCHISCIS.

Trochisci gallie moschatae.

Valent ad roborandum cor, cerebrum, & matricem, ex ipsis fiunt emplastra pro matrice.

Trochisci gallie moschatae Nicolai.

Vim habent calefaciendi & exsiccandi, roborandi & discutiendi flatus in vtero, & ita corrigit intemperiem humidam cum affluxu illius.

Trochisci Aliptæ moschatae.

Valet ad conficienda emplastra vteri pro sterilibus.

Trochisci gallie elephanginae.

Sunt efficaces ad roborandum ventriculum, cor, cerebrum, hepar, & reliquas partes nutrientes. Dos. à ℥.ij. ad ʒ. j.

Throchif

Trochisci ramich.

Roborant cor, ventriculum & hepar
magis quàm prædicti galliæ elephangi-
næ, sub eadem dosi, & fluxionem sistunt.

Trochisci de spodio.

Etiam fluxionem sistunt, & faculta-
tem retentricem roborant. Dos. à ʒ. ad
ʒ. j. β.

Trochisci de Karabe.

In muliebri profluuio, in hæmorra-
gia, in diarrhæa & similibus euacuatio-
nibus valent. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. iiij.

Trochisci de absinthio.

Plurimum conducunt ad excitā-
dum appetitum, roborantque ventricu-
lum & hepar, & obstructions harum
partium emendant. Dos. à ʒ. β. ad ʒ. j. β.

Tro

Trochisci de rhabarbaro.

Facultatem habent incindendi, attenuandi, tergendi & roborandi, & purgandi humorem biliosum per vrinam, proinde cum felici successu possumus uti in hydrope, ictero, & obstructionibus inueteratis, ut in his quæ relinquuntur in hemitritæo, aut in alia specie tertianæ spuria. Dos. à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ʒ.

Trochisci de eupatorio.

Vtuntur medici his trochiscis in ictericis & hydropicis, profunt enim valde lienis & hepatis tumoribus. Dos. a. ʒ. j. ad ij.

Trochisci de terra sigillata.

Vim habent roborandi facultatem naturalem retentricem, & incrassandi sanguinem, nam hi sunt efficacissimi in tuto sanguinis thoracis, in profluvio muliebri, & denique cohibent reliquas immo

immodicas euacuationes. Dos. à 3. ss.
ad 3. j. ss.

Trochisci de berberis.

Diarrhæas sistit præsentē febre ardente. Dos. à 3. ss. ad 3. ij.

Trochisci de mirrha.

Optimi sunt ad secundinas pellen-
das in partu laborioso, ad fætum mor-
tuum eiiciendum, ad menstrua prouo-
canda. Dos. à 3. ss. ad j. ss.

Trochisci de capparibus.

Conducunt in lienis scirrho, quo
viscus ab obstructionibus liberant, fla-
tus discutunt. Dos. est eadem.

Trochisci diarrhodon.

Ad febres pituitosas valent, inuete-
ratas & aliis implexas, ad ventriculi do-
lorem mulgendum, & humores ipsi ad

hærentes detergendos. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ.ij.

*Trochisci de spodio cum semine
acetosa.*

Valent ad sitim extinguendam, & ad
ventriculi & hepatis inflammationem.
Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ.ij.ʒ.

Trochisci alkekengi.

Vtuntur medici in ardore urinae his
trochiscis, profunt renibus ulceratis,
vriteribus, & vesicae, & meatui ordina-
rio ulcerato, & dolores istarum partium
mitigat. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ.ij.

Trochisci alhandal.

Optimi sunt ad purgandos humores
crassos ex partibus longinquis, in para-
lysi stupore, in convulsione ex repletio-
ne, & similibus affectibus, in quibus &
in apoplexia parantur enemata & sup-
positoria. Dos. à ʒ.ij. ad iij.

L

DE MEDICAMENTIS
purgantibus.

Pillula aggregatiua.

Præcipuè purgant bilem, & omnes humores, cùm etiam humorem pituitosum & melancholicum purgent. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ.iiij.

Pillula de Rhabarbaro.

Solum euacuant humorem biliosum à ʒ.ij. ad iiij.

Pillula fetida maiores.

Purgant ex partibus longinquis humores crassos & cõtumaces melancholicos & pituitosos. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ.iiij.

Pillula de Agarico.

Humorem pituitosum in thorace positum purgant hæ pillulæ. Dos. à ʒ.ij. ad ʒ.ʒ.

ʒ.ʒ.

Pil

Pillula lucis maioris.

Profunt cum fœlici successu in oculorum affectibus. nam purgant humorem pituitosum in cerebro contentum. Dos. à ʒ. ij. ad iiij.

Pillula lucis minoris.

Eandem habent facultatem, sed potentiores. Dos. à ʒ. ʒ. ad ʒ. j.

Pillula Indæ.

Utuntur medici his pillulis ad purgandos humores melancholicos. Dos. à ʒ. ʒ. ad ʒ. iiij.

Pillula stomaticæ.

Ad iuuandam coctionem & retentionem alimentorum utuntur medici: utuntur namque ante cibum, præsertim in iis in quibus non fit retentio alimenti. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. ij.

Pillula elephangina.

Ad mundificandum ventriculum, cerebrum & instrumenta sensuum ab humoribus crassis & putridis valent. Valent etiam ad corroborandum stomachum, iuuant enim coctionem. Dos. à ʒ. ij. ad iiij.

Pillula cochiae Rhasis.

Utantur medici, his pillulis in dolore capitis inueterato, ut in hemicrania & cephalaea, in paralyfi & epilepsia, & aliis affectibus, in quibus oportet cerebrum purgare ab humoribus pituitosis. Dos. à ʒ. ij. ad iiij.

Pilula fumaria.

Valent in pruritu scabiei & affectibus cutaneis: nam succus fumiterræ facultatem habet purgandi humores biliosos & adustos per urinam. Dos. à ʒ. ij. ad ʒ. i.

Pillula

Pillula AZaiareth.

Facultatem habent purgandi humorem biliosum contentum in primis venis; etiam euacuant excrementa putrida ventriculi. Valent ad præcautionem pestis, si sumantur per plures dies. Dos. 3.ß.

Pillula Rhasis.

Tempore pestis ad præcautionem possunt exhiberi singulis diebus, iuuant enim ventriculi coctionem, illumque expurgant ab excrementis pituitosis, biliosis, & aliis putridis, quibus parati sunt homines incidere in obstructions præterea possumus optimè vti his pillulis absente constitutione pestilenti ad præcauendos alios morbos. Dos. 3.j.

Pillula Aurea.

In ophthalmia & hemierania calida, possumus vti his pillulis. Dos. à ʒ. ij. ad iij.

Pillula arthritica.

Ad podagram, chiragram, & similes
affectus articulorum profunt. Dos. à 3.
3. ad 9. iij.

Pillula mastichina.

Valent ad purgandam bilem & pi-
tuitam tenuem. Dos. à 9. ij. ad iij.

Pillula sine quibus.

Quibus utimur in opthalmia ex bile,
& in aliis affectibus, ut in tertiana notha,
ad purgandum humorem biliosum &
pituitosum. Dos. à 3. 3. ad 3. j. 3.

Pillula cochia Galeni.

Ad purgandos crassos humores de
partibus longè distantibus valent. Dos.
à 9. j. ad iij.

Pil

*Pillula de quinque generibus mi-
robolanorum.*

Optimæ sunt ad purgandam bilem,
pituitam & melancholiam. Dos. à ʒ. β.
ad ʒ. iij.

Pillula de lapide Armeno.

Vehementi facultate sunt præditæ ad
purgandum humorem melancholicum.
Dos. à ʒ. ij. ad iij.

*DE MEDICAMENTIS
purgantibus in formam
confectionis.*

Confectio hamec.

Utuntur medici hac confectione ad
purgandam melancholiam & bilem fla-
uam. Dos. à ʒ. ij. ad ʒ. x.

Confectio diaphanicon.

Euacuat ex partibus propinquis pi-

ruitam. Dos. à ʒ. iij. ad ʒ. xij.

Confectio diacatolichon.

Omne redundantiā humorū
purgat. & præcipuè bilem. Dos. à ʒ. iij.
ad xv.

Confectio diasenæ.

Cum fœlici successu vtuntur medici
hac confectiōe ad melancholia labo-
rantes. Dos. à ʒ. iij. ad xij.

*Confectio Indi maioris &
minoris.*

Valet ad purgandam pituitam. Dos.
à ʒ. iij. ad ʒ. xij.

Confectio diaprunis solitiui.

Optima est hæc confectio ad purgan-
dam bilem, ad emendandam iecoris ca-
lidam intemperiem. Dos. à ʒ. iij. ad xij.

Con

Confectio Gentilis laxativa.

Humorem melancholicum euacuat.
Dof. à ʒ. iij. ad xiiij.

Confectio benedicta.

Vtuntur medici hac confectione ad
enemata paranda in quibuscunque fri-
gidis affectionibus ad irritandum. Dof.
per sedem ʒ. ij.

Confectio hieræ. S.

Eisdem affectibus est optima, quibus
exhibetur pulvis hieræ f. Gal. Dof. à ʒ. iij.
ad viij.

Confectio hieræ. C.

Ad enemata paranda possumus uti
hac confectione ad pituitam vitream
euacuandam. Dof. ab ʒ. j. ad ʒ. ij.

Confectio hieræ logadionis.

Etiā ad enemata paranda vtuntur

L S

medici hac confectione ad apoplecticos
& paralyticos. Dos. eadem sit.

Confectio hiera diacolocintidis.

In dolore capitis inueterato valet,
nam crassos humores ex partibus lon-
ginquis euacuat. Dos. à ʒ. iij. ad ʒ. j.

Confectio electuarij rosati.

Valet ad purgandam bilem, est gra-
tum medicamentum. Dos. à ʒ. iij. ad xij.

Cassia preparata.

Optima est ad potiones purgantes, ad
enemata paranda, & ad conficiendos
bolos. Dos. à ʒ. iij. ad ʒ. ij.

*Confectio Zaqualtipan, nostra vulgo
xalapa.*

℞. Zaqualtipanis	_____	ʒ. iij.
Sacchari albi	_____	ʒ. j. β.
		<u>Cin</u>

Cinnamomi	} añ. —	3.iiij.
Zinziberis		
Cariophylorum		
Polipodij quercini	—	3.ij.
Mannæ electæ.	—	3.ß.
Pulueris dragach.fr.	—	3.iiij.
Thurbith	—	3.iiij.ß.
Radiciß saxifragiæ	—	3.j.
Rhabarbari electi	—	3.vj.
Spicæ nardi	} añ. —	3.ij.ß.
Piperis longi		
Anisi		

Terantur subtilissimè & cum melle
q. s. fiat confectio, quæ sub quantitate 3.
vj. ad summum, & 3.iiij. ad minimum da-
tur. Permiscetur etiam cum aliis confe-
ctionibus, ad purgandum humorem bi-
liosum & pituitosum.

Zaqualtipan, vulgo xalapa est radix
quædam noua ex India occidentali ap-
portata; est namque medicamentum be-
nignum, & fuit à nobis expertum fœli-
ci cum successu. Solus etiam puluis da-
tur à 3.j. ad ij.

Noster optimus & peritus senex Pa-
ter frater Antonius Castell huius mo-

nafterij Montisserrati insignis Pharma-
copola, rerum Indicarum vigilatissimus
indagator, in Hispania fuit primus, qui
periculum de huius radicis proprietate
fecit, cum à quodam religioso consorte
suo, in ipsa insula zaqualtipan nuncupa-
ta, eleemosynas pro suo cœnobio quæ-
sitante, missa fuit quædam quantitas ra-
dicis suprædictæ; illiusque virtutem (ut
scriptum fuit ab illo) veram & quasi mi-
raculosam inuenit, quare inter confe-
ctiones purgantes visum fuit hanc no-
stram reponere, ut possit medicus si vo-
luerit, vel in puluerem, vel in formam
dictam præscribere.

CONFLECTIONES

cardiacæ.

Confectio Alchermes:

Utuntur medici ad roborandum cor
in syncope, in palpitatione & aliis cor-
dis affectibus. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. ij.

Con

Confectio Gent. cord. cont. mel.

Valet ad flatus discutiendos melan-
cholicos, ad roborandum cor & omnes
partes internas, & ad conciliandum som-
num. Dos. à ʒ.ß. ad ʒ.ij.

Confectio Iacinthorum.

Valet tempore pestis & aliis morbis
malignis. Dos. à ʒ.ij. ad ʒ. j.ß.

Confectio diamoschi dulcis.

Valet ad vterinos affectus, & ad dis-
cutiendos flatus. Dos. à ʒ.ß. ad ʒ. j.ß.

Confectio diamoschi vsualis.

Habet facultatem roborandi cere-
brum & ventriculum, ad affectus me-
lancholicos etiam valet. Dos. est eadem.

Confectio limonata smaragdorum.

In epilepsia puerorum est efficacissi-
mum.

num remedium, valet etiam in cordis affectibus. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. iiij.

Confectio Theriaca de citro.

Vtuntur medici hac theriaca in morbillis & variolis, præterea in febribus puncticularibus, & ferè in omnibus infirmitatibus puerorum ab obstetricibus commendatur. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. j.

ALIAE CONFECTIOES.

Confectio requiei puerorum.

Hac confectioe vtuntur mulierculæ in affectibus ventriculi, & cerebri frigidis; est namque familiarissimum medicamentum pueris, cum foelici successu. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. j.

Confectio diacidonitis Placa.

Summoperè roborat & purgat aliquo modo ventriculum. Dos. à ʒ. ʒ. ad ʒ. j. ʒ.

Corz

Confectio diacidonitis Galeni.

Ad roborandum ventriculum valet
vomentibus biliosa quotidie. Dos. à 3.ß.
ad 3.j.

Confectio diasatyrium.

Celebrata est hæc confectio ad exci-
tandam venerem, hecticis etiam prodest.
Dos. à 3.ij. ad iij.

Confectio cyphoides.

Valet in Anasarca, si sola exhibetur:
verum si datur cum electuario arom.
ros. valet in tympanite. Et si datur cum
succo Ireos, valet in Ascite. Dos. à 3.ij.
ad 3.vj.

Confectio de baccis lauri.

Vtuntur medici hac confectio in
dolore colico ex pituita vitrea. Dos. à
3.j. ad iij.

Cor

Confectio anacardina.

Si datur cum conserua sthecados vel
melissæ, valet ad recuperandam memo-
riam, datur etiam in apoplexia & para-
lysi. Dos. à ʒ.ij. ad ʒ.j.ß.

Confectio diacurcuma maioris.

Optima est in frigida iecoris inrem-
perie, ventris, renum, & matricis. Dos. à
ʒ.ß. ad ʒ.iiij.

Confectio dialacca magna.

Valet ad eosdem affectus, ad quos va-
let diacurcuma, sub eadem quantitate.

Confectio dialacca Isæ.

Sub eadem quantitate & ad eosdem
affectus valet hæc confectio, ad quos ipsa
diacurcuma.

Confectio dianisij.

Valet ad discutiendos flatus ventri-
culi,

Medicina.

257

iliculi, etiam prodest tussi à pituita orra,
Dof. à ʒ. j. ad ʒ. iij.

Confectio lithontripon.

Optima est in suppressione urinæ ex
humoribus lentis & crassis. Dof. à ʒ. ij.
ad iij.

Confectio phylanthropos.

Easdem habet vires, quas habet li-
thontripon.

Confectio philoni maioris.

In ingenti dolore & inflammatione
ventriculi vtuntur medici hac confe-
ctione, & ad conciliandum somnum in
febris biliosis, cautè tamen vtenda ve-
nit hæc confectio. Dof. à ʒ. β. ad ʒ. j.

Confectio philoni persici.

Valet in sputo sanguinis mirabiliter,
& in diarrhæa & dysenteria, quando mi-
tio

tiora medicamenta non profunt. Dos.
℞.j.ad ℞.iiij.

Confectio requiei magna.

Ad somnum conciliandum in qua
cumque febris specie valet. Dos. à ℞.ij.
ad ℞.j.β.

Confectio micleta.

In diarrhæis contumacibus est utilis
Dos. à ℞.j.ad iiij.

Confectio trium piperum. f. Gal.

Ad flatus ventriculi discutiendos &
quando refertus est pituitæ copia, vale
hæc confectio, addendo electuarium li
quidum arom. ros. Dos. à ℞.j.ad iiij.

Confectio Theriace magna.

Optima est aduersus frigidos vter
affectus, cerebri, renum & aliarum par
tium, tempore pestis aduersatur venena
tæ qualitati, morsibus animalium vene
natorum,

torum, & denique ipsis venenis assumptis. Dos. à ʒ.ß. ad ʒ.ʒ.ß.

Confectio mithridati.

Valet ad menses purgandos, & ad omnes affectus, ad quos valet theriaca angina. Dos. à ʒ.ß. ad ʒ.iiij.

Confectio triphera magna.

Prodest si conficitur sine opio, ad flatibus in longinquis partibus existentes discutiendos, & aduersus intemperiem frigidam, obstetrices vtuntur hac confectione ad menstrua purganda. Dos. à ʒ.ʒ. ad ʒ.iiij.

Confectio antidoti hæmagogi.

Etiā est optima ad purgandos menses cum aqua melissæ vel sabinæ. Dos. à ʒ.ʒ.ß. ad ʒ.iiij.

Confectio scordij.

In constitutione pestilenti multum
pro

prodest, si datur cum aqua stillati
scordij. Dos. à ʒ.β. ad ʒ. j.

Confectio triphera Sarracenica.

Valet ad discutiendos ventriculi fl
tus, & ad sedandum dolorem in ip
contentum. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. ij.

Confectio diaspolitici.

Ad eodem affectus valet, ad quos v
let triphera Sarracenica, sub eisdem do
fibus.

Confectio diatefferon.

Optima est ad epilepsiam, paraly sin
& alios morbos frigidos ventriculi
hepatis, & aliquando ad morsus scon
pionum. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. ij.

*DE MEDICAMENTIS
externis.*

Collirium Lancfranc vsuale.

Facultatem habet exsiccandi & ter
ge

di vlcera sordida pudendi, & alia-
partium.

Collyrium album Rhazis.

n ophthalmia vtuntur medici hoc
yrio cum opio si ingens, adsit dolor,
osque opio si non est dolor.

Collyrium album vsuale.

vtuntur etiam medici hoc collyrio
culorum ægritudinibus, nam facul-
m habet repellendi, exsiccandi, & re-
uerandi, & dolorem leuem mitigandi.

Oleum amygdalarum dulcium.

irificè prodest hoc oleum in variis
ctibus. Imprimis optimum est ad
chondandas siccitates asperæ arteriæ ex
tate contractas, valet ad dolorem
umriticum cum saccharo cādido per-
um, in ileo & in colico ad emol-
dam alium, & ad dilatandas partes.
ab ℥.β. ad ℥.iiij. Præterea exterius
appli

applicatur in dysuria, si dolor adest, si
 meatu vrinario si iniiciatur per fistula
 Prodest etiam ad emendandas & cor-
 gendas siccitates neruorum: vtile est
 marasmo affectis, atrophiam, & rabidam
 valet ad vngendos articulos in defa-
 gatis extinere, nam lassitudinem eme-
 dat, valet etiam ad iuuandum sputum
 pleuritide.

Oleum sesamini.

Valet ad iuuandum sputum in
 tarrho, in pleuritide & asthmate.

Oleum ricinum ex baccis lauri.

Optimum est in dolore colico,
 discutiendos flatus, aperit, emollit &
 temperiem frigidam absque fluxu
 moris emendat. Valet etiam in quib-
 cunque frigidis affectibus partium
 uosarum & cerebri.

Oleum rosarum omphacinum.

Valet in principio phrenitidis, n
 refi

refrigerat, & repellit, & aliis affectibus
pituitis, præcipuè in vulneribus, ne cere-
brum partes tententur aliqua inflamma-
tione; & valde efficax est ad parandum
refrigerans Galeni pro febre
efficitur.

Oleum rosarum.

Facultatem habet modicè digeren-
ti, repellendi, & refrigerandi. Parant ex
hoc medici oxirrhodina in incremento
nephritidis.

Oleum violarum.

Optimum est in calida intemperie, in
inflammationibus, parantur etiam ex eo
oxirrhodina, & enemata, & vnguenta ad
acciditatem emendandam, & corrigen-
dam, spinæ dorsi, vt in marasmo, aut in
acciditate contracta per febrilem ca-
lorem.

Oleum chamomilla.

Modicè calfacit, resoluit & partes
neruosas

neruofas roborat, & dolorem fedat.

Oleum anethinum.

Facultatem habet digerendi, fedandi
dolores ad partes neruofas.

Oleum cydoniorum.

Valet ad cohibendas fluxiones ven-
triculi in diarrhæis, & vomitionibus.

Oleum myrtinum.

Ad eofdem affectus valet ad quos
valet oleum cydoniorum, fed efficacius.

Oleum masticbinum.

Ad emendandas immodicas euacua-
tiones fiue per aluum, fiue per vterum
valet.

Oleum nardinum.

Facultatem habet digerendi, adstrin-
gendi, & calefaciendi, vnde in vteri
affectibus

Medicina.

265

affectibus hepatis & ventriculi vtuntur
medici & obstetrices in coriza puero-
rum naribus apposita.

Oleum absinthij.

Valet ad corroborandum ventricu-
lum & corrigendam intemperiem frigi-
dam eiusdem.

Oleum ruta.

Insignem habet facultatem calefa-
ciendi, extenuandi, & digerendi in co-
lico dolore ex pituita vitrea.

Oleum costinum.

Valet in neruorum affectibus, nam
habet insignem facultatem roborandi,
calefaciendi, attenuandi, aperiendi ner-
uorum genus.

Oleum de euphorbio.

Optimum est hoc oleum in hemi-

M

cranea, cephalalgia, & lethargo. Valet etiam in affectibus frigidis neruorum.

Oleum de lilio.

Vtuntur medici hoc oleo in glandulis inflammatis, tum in collo, tum in inguinibus, & etiam sub alis, nam habet facultatem calefaciendi, resoluendi, & concoquendi.

Oleum irinum.

Valet ad resoluendum, maturandum & dolorem sedandum etiam in glandulis induratis, & in quibuscunque aliis tumoribus.

Oleum de croco.

Habet facultatem roborandi neruos, & vterum, & sedat dolores harum partium & durities dissipat.

Oleum laurinum.

Habet easdem facultates, quas habet oleum ex baccis lauri.

Oleum

Oleum de piperibus.

Habet facultatem calefaciendi; attenuandi, tergendi & liberandi ab obstructionibus. Proinde vtuntur medici hoc oleo in paralyfi & in conuulsione, & in quibuscumque neruorum frigidis affectibus, vteri, colli, renum, & vesicæ, quarum partium calculos comminuit. In arthritide & ischiade etiam valet.

Oleum moschelinum.

Ad omnem frigiditatem corporis valet, potissimum ventriculi, & lateris in pleuritide notha.

Oleum de capparibus.

Ad aperiendas obstructiones lienis valet.

Oleum tamarasci.

Easdem habet facultates, ac superius explicatum de capparibus.

Oleum castorei.

Habet facultatem incindendi & attenuandi crassos humores in articulis existentes; est enim optimum in quibuscunque frigidis affectibus, præsertim si oportet altas petere partes.

Oleum scorpiorum.

Vtuntur medici hoc oleo in dolore nephritico, in colico, in retentione urinæ, & similibus.

Oleum lumbricorum.

Habet facultatem incindendi, leniendi & digerendi humores in partibus colli & articularum.

Oleum hypericon.

Medici vtuntur hoc oleo in dolore nephritico, colico, & schiatico: Chirurghi in capitis vulneribus.

Oleum

Oleum vulpinum.

In arthritide, podagra & chiragra valet oleum hoc, vt docet Syluius.

Oleum de portulaca.

Frigidam habet facultatem, vnde existente nimis calido hepate, vt in diarrhæa, multum prodest.

Oleum papaueris albi.

Ad sedandos dolores ingentes medici & chirurgi vtuntur hoc oleo, hebetando sensum. Valet ad conciliandum somnum in phrenitide.

Oleum sambucinum.

Hoc oleum lenit & mundificat cutim, & confert doloribus neruorum, & fouet & corroborat eos.

Oleum sampsuchinum.

Neruos fouet & calefacit, & mirificè

adiuuat stomachum, & capitis dolori confert.

Oleum cheyrinum.

Humores crassos resoluit, & dolores qui sunt in nervis, & iuncturis, in pectore, renibus & vesica sedat.

Oleum de myrrha.

Maculas faciei ex sole contractas detergit.

Oleum ex ouis.

Valet ad curanda vlcera maligna & fistulosa, & vitia cutis expurgat.

Oleum de lateribus.

Insignes habet facultates: nam calefacit & siccat multum & digerit, & materiam omnem excrementitiam consumit. Quare epilepsiæ, paralyti, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicæ, vteri, nervorum, articulorum omnium doloribus frigidis mirificè conducit.

Oleum

Oleum de therebentina.

Hoc oleum in omnibus ægri-
tudini-
bus frigidis & flatuosis conuenit; & fri-
gidis neruorum affectibus, in asthma-
& difficultate anhelitus etiam prodest.

*DE VNGVENTIS.**Vnguentum album RhaZis.*

Facultatem habet refrigerandi &
exsiccandi, chirurgi vtuntur illo in vlce-
ribus ex combustione, & in vulneribus
superficialibus.

Vnguentum de lithargyrio.

Valet ad refrigerandum & exsiccan-
dum, & in pruritu & scabie sæpissimè
applicatur.

Vnguentum diapompholygos.

In inflammationibus vlcerum & eo-

rumdem humiditatibus vtuntur chirurgi hoc vnguento: valet etiam in vlceribus contractis ex pruritu, est namque medicamentum cicatricem inducens.

Vnguentum rosaceum.

Commendatur ad sedandum phlegmonem, erysipelata, herpetas, & ad corrigendam calidam cephalalgiam, & denique ventriculi & hepatis intemperiem calidam.

Vnguentum rosatum santalatum.

Magis refrigerat, & roborat hoc vnguentum quàm superius propositum, ac proinde eo vtuntur medici in hepatis intemperie calida & in dolore renum contracto ex calida intemperie, & in similibus affectibus.

De vnguento Aegyptiaco.

Vtuntur chirurgi hoc vnguento in vlceribus cacoëthibus, inducit enim scaram;

ram ; incindit & attenuat, & tergit carnem mortuam, & reliqua excrementa; valet in vlceribus pudendorum, ad collyria illius partis paranda, lotionesque conficiendas.

Vnguentum basilicon.

Vtuntur eo chirurgi in bubonibus, in pernionibus suppuratis, & apertis, & in aliis capitis & aliarum partium vlceribus.

Vnguentum mediae confectionis.

Valet ad vulnera simplicia, ad modicè tergendum & exsiccandum.

Vnguentum nigrum sarracenum.

Insignem habet facultatem attrahendi, extergendi & expurgandi excrementa & vulnera exsiccandi, hinc in capitis vulneribus optimum est.

M

S

Vnguentum resumptiuum.

Valet ad corrigendam siccam intemperiem & aliquantulum calidam, nam per excessum est frigidum & humidum, ideoque valet ad consumptos hecticos, ad macie laborantes & ad motus convulsivos contractos in febribus ardentibus.

Vnguentum citrinum.

Optimum est ad emendanda faciei vitia ex causa externa, hinc maculas à sole contractas tergere valet.

Vnguentum de arthanita.

In ascite valet hoc vnguentum, dum reliqua non profunt: nam abdominis purgat aquas & serosos humores.

Vnguentum album sarracenum.

Valet ad repellendum & refrigerandum, proinde vtuntur chirurgi eo com-

me

modissimè in vulneribus partibus circumstantibus apposito.

Vnguentum apij.

Excrementa bubonum extergit, vtuntur eo chirurgi primis diebus cum elychniis quæ apponuntur parti internæ bubonis.

Vnguentum de minio.

Est sanè optimum ad vlcera exsiccanda dum medicamenta leuiora non profunt.

Vnguentum pomorum.

Ad emendanda vitia labiorum & narium valet, & ad faciem dealbandam, & illius vitia etiam emendanda.

Vnguentum tutiæ.

Valet ad oculorum inflammationes nam repellit & digerit.

Vnguentum Apostolorum.

Facultatem habet incindendi & ter-
gendi excrementa in vlceribus existen-
tia, & eadem extrahendi & exsiccandi
humiditates. Hinc vsus frequentissi-
mus illius est in vlceribus vteri, & pu-
dendi cacoëthibus.

Vnguentum de althea.

Insignem habet facultatem digeren-
di, vnde valet ad resoluendos humores
tumorum & aliarum partium indura-
tarum.

Vnguentum Agrippæ regis.

Resoluit & digerit tumores, vnde
in bubonibus & in ventris tumoribus,
& in hydrope vtuntur eo medici.

Vnguentum comitissæ.

Valet ad sistendas fluxiones vteri &
alui,

Medicina.

277

alui, roborat namque & adstringit. vnde
valet in profluuio rebeli muliebri, in
contumaci diarrhæa, & in deiectionibus
hepaticis.

Vnguentum contra scabiem.

Potentissimè curat scabiem & pruritus.

Vnguentum aureum.

Optimum est ad vulnera curanda, excrementa tergendâ, & humiditatem exsiccandam.

Vnguentum contra tineam.

Valet vt titulus declarat.

Vnguentum Aragon.

Habet insignem facultatem in quiscunque frigidis affectibus, præsertim colico dolore ex pituita vitrea & aliis morboribus natis ex materia frigida.

Vn

Vnguentum martiaton.

Anodinam quandam facultatem habet, proinde sedat dolores.

Vnguentum populeon.

Narcoticum est hoc vnguentum, proinde refrigerat, somnum conciliat, in febribus ardentibus, & phreniticis prodest. Valet etiam ad combustos, & ad dolores sedandos, & ad intemperiem calidam temperandam. Empyrreumatismo utimur.

*DE CERATIS.**Ceratum refrigerans Galeni.*

Gal. 10. meth. cap. 9. docet vnguentum vel ceratum hoc valde refrigerare & humectare, valet ad hecticos & consumptos.

Ceratum santalatum.

Optimum est ad roborandum &

frigigerandum hepar, in deiectionibus
hepaticis biliosis, valet etiam ad intem-
peries calidas renum, & ad alias similes.

Ceratum ex thapsia.

Vruntur medici hoc cerato in vehe-
mentissimis distillationibus ad exsiccan-
dum, ad attrahendum humorem effi-
cientem distillationem.

Ceratum spadadrap.

Frequentissimus est huius cerati vsus
in vlceribus antiquis exsiccandis.

*DE EMPLASTRIS.**Emplastrum diachilonis
communis.*

Temperatissimum est, & ita vsum il-
lus laudamus in scirrhis & aliis rebel-
bus tumoribus.

Em

Emplastrum diachilonis magni.

Valet ad emolliendos & digerendos
tumores.

Emplastrum diapalme.

Valet ad curanda vlcera antiqua.

Emplastrum stomaticonis confortatini.

Optimum est ad roborandum ven-
triculum, & corrigendam intemperiem
frigidam illius.

Emplastrum oxicroci.

Optimus est huius emplastri vsus in
dolore contracto ex aliqua contusione
in ossium fracturis & dislocationibus.

Emplastrum Guillermi seruatoris.

Ad eodẽ affectus valet ad quod
valet emplastrum oxicroci.

E

Emplastrum contra conquassationem.

Habet vim digerendi ac dissipandi
humorem extrauasatum ex contusio-
nibus.

Emplastrum de centaurea.

Optimum est in vulneribus capitis.

Emplastrum de palmitibus.

Valet ad extergenda & exsiccanda ex-
crementa & humiditates quæ apparent
in vlceribus, & præcipuè vsus huius
emplastri est in vlceribus antiquis.

Emplastrum contra rupturam.

Ad hernias curandas valet hoc em-
plastrum, puerorum nimirum aquosas,
valet etiam ad fœtum detinendum.

*Emplastrum contra rupturam ex pelle
arietina.*

Valet ad consolidandum & vnien-
dum

dum peritonæum ruptum in ea regione
in quam vel omenta vel intestina des-
cendunt. Etiam valet ad hernias aquo-
sas & flatuosas. Valet denique ad cu-
randum eneurisma.

Emplastrum contra durities.

Prodest ad emolliendos duros tu-
mores.

Emplastrum de ranis.

Doloribus ex morbo Gallico contra-
ctis, præcipuè talpariis prodest.

Emplastrum diapheniconis.

Valet ad iuuandam ventriculi con-
tractionem, ad vomitum sistendum, &
emendandas contumaces alui euacua-
tiones.

Emplastrum catagenum.

Optimum est in tumoribus gallico
in capite existentibus.

Emplastrum de gratia Dei.

Valer' ad vlcera antiqua curanda,
quando alia emplastra non profunt.

*Emplastrum Apostolicum chi-
rurgicum.*

Easdem habet facultates, & ad lienis
rrhos.

Emplastrum diuinum.

Easdem, sed imbecilles habet facul-
tes.

Emplastrum de geminis.

Optimum est ad curanda vlcera, in
quibus leui occasione apparent quoti-
dianae inflammationes.

Emplastrum filij Zachariae.

Valer' ad durities emolliendas, & fa-
uora reddit excrementa in thorace
persistencia ad expuendum.

Em

Emplastrum de meliloto.

Habet vim emolliendi & discutiendi
flatus, & digerendi, tum etiam & robo-
randi; hinc in tumoribus duriusculis
ventris, hepatis & aliarum partium
prodest.

*Laus Deo, Beata Mariae & Sancti
Ioanni Baptista, huic operi im-
posuimus manum 24.*

Iunij 1622.

INDE



INDEX RERVM
ET VERBORVM
COPIOSISSIMVS.

Numerus ubique paginas indicat.

A EDICORVM sectæ tres. pag. 1.	
Empirici medici.	ibid.
Methodici medici.	ibid.
Rationales medici.	ibid.
Suppus medicinæ sanitas.	ibid.
Medicina præceptorum collectio.	ibid.
Medicus rationalis methodo rationali curat.	2
Rationalis medicina amplectenda.	ibid.
Empirica & methodica medicina con- iuncta.	ibid.
Medicine & via rem tradere.	ibid.
Methodus medendi fit per medicatio- nes.	ibid.
	Indicatio

Index Rerum

Indicatio vocatur id totum quod ab experientia separatum est. *ibid.*

A primis indicationibus incipiat, qui rationalem methodum medendi con-
ficere voluerit. *ibid.*

In rerum disquisitione aliud primum
aliud secundum, aliud tertium, &
ibid.

Indicatio debet esse perfecta, ad hoc
intelligatur methodus rationalis.

Indicatio est rei agenda insinuatio. *ibid.*

Indicatio est comprehensio rei iuvantis
simul cum comprehensione nocen-
tis citra experientiam & observati-
onem. *ibid.*

Morbus calidus frigidis curatur, &
contra.

Altomarius deceptus circa materialia
iuvantem & nocentem. *ibid.*

Affectus præter naturam non est
agenda in curatione morborum
ibid.

Contrariorum eadem est ratio & disci-
plina.

Indicatio duplex, curatrix & non cu-
ratrix.

Et verborum.

Vires corroborare primum, quando
sunt probratae. ibid.

Vires nostrum corpus gubernantes in
triplici sunt differentia. ibid.

Vires seruare, est vitam custodire. ibid.

Facultas animalis sedem habet in cere-
bro. 6

Vitalis facultas sedem habet in corde.
ibid.

Naturalis facultas sedem habet in he-
pate. ibid.

Vitalis facultas dignior est cæteris fa-
cultatibus. 6

Naturalis facultas debet esse robusta in
venis, vt possit superare humores no-
xios. ibid.

Collocantur vires in substantia solida,
carnosa & spiritosa. ibid.

Substantia solida dissipata restauratur
cibo. ibid.

Humida substantia dissipata restauratur
potu. 7

Spiritosa substantia dissipata restaura-
tur inspiratione & tractu arteriarum.
ibid.

Quous virium lapsu non sunt præ-
scri

Index Rerum

- scribenda cardiaca. 7
Pestis tempore & sumpto veneno con-
ueniunt Alexipharmaca. ibid.
Indicatio curatrix est triplex. ibid.
Indicatio quæ sumitur à morbo, in tot
diuiditur differentias quot sunt mor-
borum species. 8
Extremis morbis extrema remedia sunt
adhibenda. ibid.
Indicatio petita à caussa reuocatur ad
indicationem à morbo desumptam.
8. 9.
Causa præsens semper indicat sui abla-
tionem. 9
Causa non præsens non indicat, sed
conducit ad cognoscendum affe-
ctum. 10
Eisdem præseruamus remediis quibus
curamus. ibid.
Indicatio quæ sumitur à symptomate,
reuocatur ad indicationem à morbo
desumptam. - ibid.
Symptoma si habet rationem causæ, in-
dicat sui remotionem. 11
Propria natura maximè cognoscenda
est à medico. 12

Propria

Et verborum.

Propria natura non potest intra rationem, sed artificiosa coniectura cognosci. ibid.

A propria natura metimur lapsum, & ex lapso quantitatem remedij. 12.13

Ad indicationem quæ sumitur à natura, refertur indicatio quæ sumitur à consuetudine, ab ætate, & à sexu. 13

Indicatio ab ambiente. 14

Materia remediorum alia communis, alia propria. ibid.

Coindicatio simul indicat cum indicatione. 15

Indicatio comprehendit curatrices & non curatrices indicationes. 16

Indicatio curatrix communis & propria. ibid.

Medicus non curat hominem in uniuersum, sed solum Ioannem, Franciscum, &c. 16

Omnes morbi non habent eandem naturam. ibid.

Omnes morbi habent communem indicationem. 17

Indicatio particularis magis excessum demonstrat quàm naturalis. 17

N

Index Rerum

- Indicationes communes non minus
vtilis sunt quæ noxiæ. ibid.
- Indicatio simplex & composita. 18
- Indicat vnum, quod vnum est. ibid.
- Indicat vnum multa, si diuersam habet
naturam compositam. 19
- Indicationes compositæ vel sunt con-
cordes, vel contrariæ. ibid.
- Indicationes aliquando sumuntur à
contrariis, & ipsæ inter sese non sunt
contrariæ. 19.20
- In contrariis indicationibus medicus
expendat indicationum numerum,
earumque dignitatem & magnitudi-
nem. 11
- Urgentiori affectui magis est succur-
rendum alio non neglecto. 23
- Quid ante quid, quid cum quo, & quid
post quod sit curandum. ibid.
- Affectus magnus ex quo pendet vitæ
periculum. ibid.
- Pestilens febris magnus est morbus. 24
- Carbunculus propter malignitatem
magnus est morbus. ibid.
- Affectui habenti rationem causæ prius
succurrendum. 26
- Phleg

Et verborum.

Phlegmone curato, fordes sunt exter-
gendæ. 28

Methodus medendi per indicationes
factas habet principium & finem. 29

Methodi medendi principium est co-
gnitio morbi. 29.30

Medico rationali necessarium est prius
cognoscere morbum, antequam in-
ueniat remedia. 30

Morbi cognitio est inuentio remedij.
ibid.

Remedium est quidquid corpori ad-
motum iuuat. ibid.

Vna & eadem res potest esse remedium
& nocens. ibid.

Materia medicamentorum reuocata ad
quatuor capita, ad sumenda, facien-
da, educenda & forinsecus aduenien-
tia. 31

Victus omnis est remedium, non tamen
è contra. 32

Scopi quatuor, qualitas, quantitas, occa-
sio, & vtendi modus. ibid.

Per qualitatem remedij, species, genus
& differentias, vel naturam remedij
intelligere oportet, 33

Index Rerum

Per quantitatem remediorum, vim re-	
mediorum intelligere oportet.	34
Occasio opportunum tempus ad agen-	
dum,	35
An semel, an sæpius sint administranda	
remedia.	36
Qua forma, qua substantia, cui parti sint	
adhibenda remedia.	ibid.
Remedia non sunt præscribenda si	
morbis est incurabilis.	ibid.
Quatuor modis deprehenditur, an mor-	
bis sit lethalis.	ibid.
Morbi non omnes curantur à medio	
rationali per indicationes, sed expe-	
rientia.	38
Non est miscenda ratio cum experien-	
tia, neque econtrà.	ibid.
Analogismo curantur aliqui morbi.	ibi.
Epilogismo curantur aliqui morbi.	39
Decidentia pilorum	40
Morbis Gallicus.	41
Achores vel tinea.	ibid.
Dolor.	42
Phrenitis.	ibid.
Lethargus.	43
Vertigo.	ibid.
	Epi

Et verborum.

Epilepsia.	ibid.
Melancholia.	44
Incubus.	ibid.
Apoplexia.	45
Paralysis.	ibid.
Convulsio.	46
Tremor.	ibid.
Ophthalmia.	47
Suffusio.	ibid.
Angina.	48
Catarrhus.	ibid.
Asthma.	49
Peripneumonia.	50
Pleuritis.	ibid.
Phthisis.	51
Palpitatio cordis.	52
Syncope.	ibid.
Ventriculi imbecillitas.	53
Singultus.	ibid.
Appetentia canina.	54
Cibi fastidium.	ibid.
Colera morbus.	55
Diarrhæa.	ibid.
Lienteria.	56
Dysenteria.	57
Tenesmus.	ibid.

Index Rerum

Colicus dolor.	58
Ileos.	59
Hepatis inflammatio.	60
Iecoris obstructio.	61
Icteria.	ibid.
Hydrops.	63
Lienis obstructio.	ibid.
Vrinae suppressio.	64
Vrinae difficultas.	65
Renum calculi & vesicae.	ibid.
Vrinae stillicidium.	66
Sanguinis mictus.	ibid.
Diabetes.	67
Lumbrici.	ibid.
Hæmorroides.	69
Ani procidentia.	ibid.
Vteri procidentia.	70
Profluuium mensium.	ibid.
Suppressio mensium.	71
Suffocatio vteri.	72
Mola.	73
Hernia.	ibid.
Artbritis.	74
Februm differentia.	ibid.
Febris diaria.	76
In omnibus febribus putridis septem	affe

Et verborum.

affectus reperiuntur.	78
Febris synochus.	80
Febris ardens.	81
Tertiana exquisita.	82
Tertiana notha.	84
Febris quotidiana.	85
Febris quartana.	ibid.
Febris hectica.	86
Febris pestilens.	88
Exanthemata.	89
Purgatio antiquis maximè vsitata fuit.	91.
Syruporum vsus ante purgationem.	ibi.
Obstructiones referare.	ibid.
Coctio ante purgationem.	92.
Sola cocta purgare oportet nisi turgat.	ibid.
Purgantia medicamenta antiquis erant fortiora, & minus correcta.	ibid.
Post purgationem aquam hordei propinare.	ibid.
Nostri temporibus medicamenta purgantia clementiora.	ibid.
Aquæ distillatæ vel decoctiones ante purgationem.	93.
Natura sola concoquit humores.	ibid.

Index Rerum

- Morbus gallicus corrigitur medica-
mentis à tota substantia. 94
- In febribus malignis & pestilentibus
aliquando miscentur confectiones
cardiacæ cum syrupis. ibid.
- Crudo existente humore molesta fit
purgatio. 95
- Fluxilia facere oportet qui purgare vo-
let. 96
- Purgatio rectè procedet si meatus sunt
aperti. ibid.
- Cruditate existente non fit optima pur-
gatio. ibid.
- A natura expellente & à medicamento
attrahente fit purgatio. 97
- Hordeum habet vim abstergendi. ibid.
- Hiera medicamentum ventriculo fami-
liare. 98
- Purgantia medicamenta maximo cum
consilio præscribenda. ibid.
- Corpora sana difficilè ferunt purgatio-
nem. 99
- Quo anni tempore purgare liceat. ibid.
- Æstate media nocte purgare. 100
- Purgantia medica exterius apposita. 102
- Forma purgantis medicamenti in for-
ma

Et verborum.

ma solida.	ibid.
post exhibitionem pillularum dormire.	
104	
ex partibus longinquis pillulae eua- cuant.	105
medicamenta purgantia liquida.	106
in omnibus ferè potionibus purganti- bus permiscetur syr. ros. alex. ex 9. infus.	ibid.
otio parua semper in pueris est præ- scribenda.	107
opiarum descriptio.	108
medicamenta purgantia torrefacta.	109
otiones purgantes ex medicamentis simplicibus.	111
simplicia medicamenta bilem purgan- tia.	112
composita medicamenta bilem pur- gantia.	113
simplicia pituitam purgantia.	ibid.
composita pituitam purgantia.	ibid.
simplicia succum melancholicum pur- gantia.	114
composita succum melancholicum purgantia.	ibid.
anguinis serum educentia.	115
	Ad

Index Rerum

Potio ad purgandam bilem.	ibid.
Ad purgandam bilem pillulæ.	ibid.
Confectio opiata ad purgandam bilem.	116
Potio ad purgandam pituitam.	ibid.
Pillulæ ad purgandam pituitam.	ibid.
Opiata ad purgandam pituitam.	ibid.
Potio ad purgandum succum melancholicum.	117
Pillulæ ad purgandum succum melancholicum.	ibid.
Opiata ad purgandum succum melancholicum.	ibid.
Pillulæ ad euacuandam bilem & pituitam.	118
Potio ad purgandam bilem & pituitam.	ibid.
Opiata ad purgandum bilem & pituitam.	ibid.
Potio ad educendam bilem & pituitam ex ventriculo & primis venis.	119
Potio ad educendam bilem & pituitam ex primis venis ubi adiuncta sit febris.	ibid.
Non indigent præparatione quæ leuiunt ex primis venis.	ibid.
Simplicia præparantia bilem.	120

Con


Et verborum.


Composita præparantia bilem.	121
simplicia præparantia pituitam.	ibid.
Composita præparantia pituitam.	122
simplicia bilem atram præparantia.	ibid.
Composita bilem atram præparantia.	123
Corrigentia medicamenta purgantia.	133
Clysteres.	135
Suppositoria.	145
Emitoria.	146
Superpurgationes.	150
Rrhina.	152
Clasticatoria.	154
Audorifica.	156
Digerentia euacuantia.	159
Diuretica.	161
Dienses mouentia.	162
pectoralia.	163
Roborantia post purgationem.	169
Generem excitantia.	170
Status discutientia.	174
Stupe facientia.	178
Cerebrum roborantia.	180
Roborantia cor.	187
	Roboran

Index Rerum & verborum.


Roborantia hepar.	ibid.
Ventriculum roborantia.	189
Vterum roborantia.	194
Sanguinis missio.	195
Facultas & dosi medicamentorum.	199
Aqua ex quinque radicibus.	201
Aqua Angelorum.	ibid.
Rob.	201.202
Iulep.	202
Syrupi.	202.& seq.
Aceta.	220.& seq.
Conseruæ.	221.& seq.
Electuaria.	226.& seq.
Loch.	228.& seq.
Pulueres.	229.& seq.
Trochisci.	237.& seq.
Pillulæ.	242.& seq.
Confectiones.	247.& seq.
Collyria.	260.& seq.
Olea.	261.& seq.
Vnguenta.	271.& seq.
Cerata.	278.& seq.
Emplastra.	279.& seq.

FINIS.





8/8



Roper Bacon
a
Carolus Amatus
in one Vol